



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <http://books.google.com>



Viscount Palmerston.

HANOVER SQUARE.

UNS: 168 d. 27




KMP

4 106

407-

10709
10709
10709
10709
10709



ŒUVRES

D E

MR. DE MAUPERTUIS.

CLAVIS

D E

MR. DE WINTER


ŒUVRES

D E

M^R. DE MAUPERTUIS.

NOUVELLE EDITION
corrigée & augmentée.

TOME QUATRIEME.



A LYON,

Chez JEAN-MARIE BRUYSET,
Libraire, grande rue Merciere, au Soleil.

M. DCC. LVI

Avec Approbation, & Privilege du Roi.





A M O N S I E U R

DE LA CONDAMINE,

DES A C A D É M I E S D E

Paris, de Berlin, de Cor-

tone, &c.

MONTAIGNE parlant
*d'un Philosophe de
 l'antiquité qui par son
 testament laissa à l'un de ses
 amis sa mere à nourrir, & à*

Ouv. de Maupert. Tome IV.

à

ij E P I T R E.

l'autre sa fille à marier , & admirant cet exemple d'amitié , ne trouve rien à redire dans Eudamidas , que d'avoir eu plus d'un ami. Le cas est rare , mais il n'est pas impossible : j'ai dédié les autres parties de mes Ouvrages à trois de ces amis si difficiles à trouver , je vous dédie celle-ci.

Le Philosophe françois voulant faire l'éloge de l'amitié , en fait ici une singulière peinture : c'est une sympathie , une force inexplicable , une passion aussi aveugle que l'amour. Celle qu'il eut pour l'homme illustre qu'il regrette s'enflamma à la première vue : si on le presse

E P I T R E. ii

*de dire pourquoi il l'aimoit ,
il ne peut l'exprimer qu'en di-
sant , parce que c'étoit lui , parce
que c'étoit moi. Je n'ai garde
de me comparer à Montai-
gne , & je ne vous compare
point à la Bætie ; j'y gagne-
rois trop , & vous y perdriez :
mais je ne suis point encore
ici du sentiment de notre Phi-
losophe ; & je me trouve dans
un cas fort différent du sien.
L'amitié qui est entre nous ne
cede certainement point à celle
qu'il eut pour la Bætie ; mais
je puis dire pourquoi je vous
aime : c'est parce que je vous
connois l'ame la plus vertueu-
se , le cœur le plus sensible ,*

iv E P I T R E.

& que vous joignez à cela tous les talents de l'esprit.

Ces talents , qu'il ne tenoit qu'à vous de tourner de tous côtés , & que ceux qui les possèdent n'emploient le plus souvent que pour eux-mêmes , vous ne les avez jamais appliqués qu'à l'utilité publique. Dans tous vos Ouvrages si le citoyen n'a pu faire disparaître le savant ni le bel esprit , il a toujours eu la première place. Ce volume de mes Ouvrages qui contient des vérités géométriques , qui ont un rapport nécessaire avec la première & la plus utile des vérités ; & dans lequel j'ai eu particulié-

E P I T R E. v

rement en vue la perfection de l'Art du Navigateur, étoit donc celui qui vous appartenoit le plus.

Vous y trouverez une partie d'un travail qui nous a été commun. Pendant que vous terminiez la figure de la Terre au Pérou, j'étois dans la Laponie chargé des mêmes opérations : la conformité de nos goûts & de nos études qui nous avoit unis en France, nous avoit conduits dans ces climats opposés qui étoient les plus propres pour décider cette fameuse question. Je recevois dans la zone glacée les lettres que vous m'écriviez de la zone

brûlante : occupés des mêmes idées, animés des mêmes motifs, vous sur Pitchincha, moi sur Horrilakero, nous étions présents l'un à l'autre.

Vous exécutâtes votre commission avec le zèle & l'habileté d'un homme fort supérieur à son ouvrage. Mais vous eûtes encore un avantage que les circonstances où vous vous trouvâtes vous offrirent, & que des circonstances plus heureuses ne mirent point à ma disposition. L'interruption du commerce causée par la guerre, & quelques autres accidents privoient votre troupe des secours de l'Europe, & vous exposoient à man-

ÉPÎTRE. vij

quer votre opération : des précautions sagement prises avant votre départ , un crédit que nos plus illustres Négociants s'étoient empressés de vous offrir , votre prudence à vous en servir , suppléerent à tout : & la partie de votre entreprise qui devenoit la plus difficile n'appartint plus qu'à vous seul.

A votre retour , dans cette occasion qui étoit une de celles où les amitiés qu'on croyoit les plus sûres se trouvent souvent des haines irréconciliables , j'écoutai la relation de vos travaux avec le même plaisir que si c'eussent été les miens ; je me crus échappé à tous vos

viiij E P I T R E.

périls , vainqueur de toutes les difficultés que vous aviez surmontées ; j'admiraï de tout mon cœur des succès qui éclipsoient les nôtres. Il manquoit encore à votre gloire des envieux , & vous en trouvâtes : la douceur & l'honnêteté de vos mœurs ne vous en garantirent point. En effet dans ceux qui sont dévorés de cette honteuse passion , ces qualités mêmes sont de nouveaux motifs plus capables de l'irriter que de l'éteindre.

T A B L E
DES OUVRAGES
CONTENUS DANS CE VOLUME.

A C C O R D
DE DIFFÉRENTES LOIX
DE LA NATURE

Qui avoient jusqu'ici paru incompatibles. page 1

RECHERCHE DES LOIX DU MOUVEMENT. 29

LOI DU REPOS. 43

T A B L E.

ASTRONOMIE NAUTIQUE,

O U

ÉLÉMENTS D'ASTRONOMIE,

*Tant pour un observatoire fixe, que pour
un observatoire mobile.*

P R E F A C E. page 69

*PREPARATION pour tout le livre, ou dénomi-
nation des principaux éléments de la sphere.*

95

PROBLÈME I. *Trouver la relation entre la
hauteur du pôle, la déclinaison d'un astre,
sa hauteur, & son angle horaire.* 98

PROBLÈME II. *Trouver la relation entre la
hauteur du pôle, la déclinaison d'un astre,
sa hauteur, & son angle azymuthal.* 100

PROBLÈME III. *Trouver la relation entre la
hauteur du pôle, la déclinaison d'un astre,
son angle horaire, & son angle azymuthal.*

102

PROBLÈME IV. *Trouver la relation entre la
hauteur du pôle, la hauteur d'un astre,
son angle horaire, & son angle azymuthal.*

104

PROBLÈME V. *Trouver la relation entre la
déclinaison d'un astre, sa hauteur, son*

T A B L E

angle horaire , & son angle azymuthal.

page 106

PROBLÈME VI. *Trouver la relation entre la hauteur du pôle , la déclinaison d'un astre , & le temps qu'il emploie sur l'horizon.* 115

PROBLÈME VII. *Trouver la relation entre la hauteur du pôle , la déclinaison d'un astre & son angle azymuthal , au moment de son lever ou de son coucher.* 117

PROBLÈME VIII. *Trouver la relation entre la déclinaison d'un astre , l'angle qu'il traverse , & le temps qu'il emploie à le traverser.* 118

PROBLÈME IX. *La hauteur du pôle , & la déclinaison d'un astre étant données , trouver l'azymuth que l'astre touche dans sa révolution.* 120

PROBLÈME X. *La hauteur du pôle , & la déclinaison d'un astre étant données , trouver la relation entre un petit changement dans sa hauteur , & le temps qu'il y emploie.* 123

PROBLÈME XI. *Trouver la relation entre la hauteur du pôle , la déclinaison du Soleil , le temps écoulé entre deux hauteurs égales de cet astre , son changement en déclinaison pendant ce temps , & la différence des temps qu'il emploie , l'un à s'élever à la hauteur observée au méridien , l'autre à descendre du méridien à la même hauteur.* 127

PROBLÈME XII. *Deux hauteurs d'un astre étant données , trouver la relation entre le*

T A B L E.

- temps qui les sépare, la déclinaison de l'astre, & la hauteur du pôle. page 133
- PROBLÈME XIII.** Deux hauteurs d'un astre étant données, trouver la relation entre l'arc azymuthal qui les sépare, la déclinaison de l'astre & la hauteur du pôle. 139
- PROBLÈME XIV.** Deux angles horaires & deux angles azymuthaux d'un astre étant donnés, aux moments de ses passages à deux verticaux, trouver la hauteur du pôle & la déclinaison de l'astre. 141
- PROBLÈME XV.** Deux astres dont on connoît les déclinaisons & les angles horaires, étant vus dans un même vertical, trouver la hauteur du pôle. 144
- PROBLÈME XVI.** La hauteur du pôle étant connue, & deux astres dont les déclinaisons & les ascensions droites sont données, étant vus dans un même vertical, trouver l'heure de l'observation. 146
- PROBLÈME XVII.** Deux astres dont on connoît les déclinaisons & les angles horaires au moment de l'observation, étant vus dans un même almicantharath, trouver la hauteur du pôle. 150
- PROBLÈME XVIII.** La hauteur du pôle étant connue, & deux astres dont les déclinaisons & les ascensions droites sont données, étant vus dans un même almicantharath, trouver l'heure de l'observation. 152
- PROBLÈME XIX.** Les déclinaisons & les ascensions droites de trois Etoiles étant don-

T A B L E.

nées , & le temps écoulé entre les moments où l'une des trois se trouve dans un même vertical avec chacune des deux autres, trouver l'heure de l'observation , & la hauteur du pole. page 155

PROBLÈME XX. Trois hauteurs d'un astre étant données , avec les deux intervalles de temps écoulés entre , trouver la déclinaison de l'astre , & la hauteur du pole. 162

PROBLÈME XXI. Les angles horaires de deux Etoiles qui passent par deux almicantharaths & par deux azymuths dont la position est inconnue mais constante , étant donnés par les temps écoulés depuis les passages au méridien jusqu'aux moments où elles coupent ces cercles , trouver la déclinaison de ces Etoiles & la hauteur du pole. 169

PROBLÈME XXII. La déclinaison du Soleil étant donnée , trouver sur mer la hauteur du pole par la durée du jour. 174

TABLE

DISCOURS

SUR

LA PARALLAXE DE LA LUNE,

*Pour perfectionner la théorie de la
Lune & celle de la Terre.*

P	REPAGE.	page 189
S	I. UTILITÉ'S dont est la connoissance de la figure de la Terre.	209
S	II. Ce que c'est que la parallaxe.	217
S	III. Dimensions géographiques.	227
S	IV. Dimensions pour la gravité.	234
S	V. Dimensions pour les parallaxes.	236
S	VI. Maniere de déterminer la distance de la Lune au centre de la Terre.	243
S	VII. Recherche de la différence des parallaxes sur la Terre & sur le globe.	246
S	VIII. Conditions qui rendent la différence des parallaxes la plus grande qu'il soit possible.	250
S	IX. Calcul de la différence des parallaxes.	255
S	X. Méthode pour déterminer la figure de la Terre.	259
S	XI. Autre espece de parallaxes.	272
S	XII. Loxodromiques.	276

T A B L E.

- S** XIII. *Projection stéréographique de la Loxodromique.* page 282
S XIV. *Projection orthographique de la Loxodromique.* 283
-

OPÉRATIONS

*Pour déterminer la figure de la Terre
& les variations de la pesanteur.* 285

M E S U R E

DU DEGRÉ DU MÉRIDIEN

AU CERCLE POLAIRE.

- I.** *Angles observés.* 290
II. *Position des triangles par rapport au méridien.* 299
III. *Base mesurée.* 301
IV. *Calcul des deux triangles par lesquels commencent toutes les suites.* 303
V. *Calcul des triangles de la première suite.* 305
VI. *Calcul des triangles de la seconde suite.* 309
VII. *Examen de la position des triangles par rapport au méridien.* 313
VIII. *Examen de l'arc du méridien qu'on trou-*

T A B L E.

<i>veroit par d'autres suites de triangles.</i>	page 313
IX. Examen des angles horizontaux par leur <i>somme dans le contour de l'heptagone.</i>	319
X. Longueur de l'arc du méridien.	321
XI. Amplitude de l'arc du méridien.	321
XII. Degré du méridien.	324

AUTRES MESURES. *ibid.*

<i>Mesure de Mr. Norwood.</i>	325
<i>Mesure de Mr. Picard.</i>	326
<i>Mesure de Mr. Cassini.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Mesure de Mr. Musschenbroek.</i>	328
CORRECTION DE LA MESURE DE MR. PICARD.	328
FIGURE DE LA TERRE.	331
ADDITION.	332
EXPERIENCES POUR LES VARIATIONS DE LA PESANTEUR.	336
MESURE DE LA PESANTEUR DANS LA ZONE GLACÉE.	336
AUTRES EXPERIENCES POUR LA MESURE DE LA PESANTEUR.	340
TABLE DES DIFFERENTS POIDS D'UNE MEME QUANTITÉ DE MATIERE DANS DIFFERENTS LIEUX DE LA TERRE.	345
DECLINAISON DE L'AIGUILLE AIMANTÉE A TORNEA.	346

AVERTISSEMENT.

AVERTISSEMENT,

VOICI dans un assez petit volume à quoi je réduis mes Ouvrages mathématiques.

Dans le premier de trois Mémoires lus dans les Académies de Paris & de Berlin, je fais voir l'accord des loix que suit la lumière dans la réflexion & la réfraction, avec celles que suivent dans leur mouvement tous les autres corps.

Dans le second je tire les loix générales du mouvement, des attributs de la suprême Intelligence & les réduis à un seul principe,

AVERTISSEMENT.

auquel sont soumis tous les corps, tant les corps durs que les corps élastiques.

Dans le 3^e. on trouve la loi universelle du repos, dont tous les cas d'équilibre, dans la Statique ordinaire, ne sont que des cas particuliers.

Le 4^e. de ces ouvrages est une Astronomie pour les gens de mer, que je donnai lorsque je fus chargé en France de travailler à la perfection de la Navigation. La préface qui est à la tête de cet ouvrage instruira de tout ce qu'il a de particulier.

AVERTISSEMENT.

Le 5^e. est un Discours sur la parallaxe de la Lune , pour perfectionner la théorie de la Lune , & celle de la Terre.

Le 6^e. contient les observations que nous avons faites pour déterminer la figure de la Terre & les variations de la pesanteur ; avec l'extrait de ce que les autres ont fait sur cela.

THE UNITED STATES OF AMERICA
DO hereby certify that
the following is a true and correct
copy of the original as
the same appears on file in the
Department of the Interior
at Washington, D. C.
this 10th day of May 1907.
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LANDS
WASHINGTON, D. C.

ACCORD

A C C O R D
DE DIFFÉRENTES LOIX
DE LA NATURE
Qui avoient jusqu'ici paru incompatibles.

Œuv. de Maupeyr. Tome IV.

A

1907

THE DISTRICT COURT OF

THE DISTRICT OF COLUMBIA

IN RE: THE ESTATE OF
JAMES M. HARRIS

A. M. HARRIS, Executor



A C C O R D

DE DIFFÉRENTES LOIX

DE LA NATURE

Qui avoient jusqu'ici paru incompatibles. *

N ne doit pas exiger que les différents moyens que nous avons pour augmenter nos connoissances, nous conduisent tous aux mêmes vérités; mais il seroit accablant de voir que des propositions que la Philosophie nous donne com-

** Ce Mémoire fut lu dans l'Assemblée publique de l'Académie Royale des Sciences de Paris le 15. Avril, 1744. & est inséré dans le recueil de 1744.*

4. ACCORD DES LOIX

me des vérités fondamentales, se trouvaient démenties par les raisonnements de la Géométrie, ou par les calculs de l'Algebre.

Un exemple mémorable de cette contradiction tombe sur un sujet des plus importants de la Physique.

Depuis le renouvellement des Sciences, depuis même leur première origine, on n'a fait aucune découverte plus belle que celle des loix que suit la lumière ; soit qu'elle se meuve dans un milieu uniforme, soit que rencontrant des corps opaques elle soit réfléchie par leur surface, soit que des corps diaphanes l'obligent de changer son cours en les traversant. Ces loix sont les fondemens de toute la science de la lumière & des couleurs.

Mais j'en ferai peut-être mieux sentir l'importance, si, au lieu de présenter un objet si vaste, je m'attache seulement à quelque partie, & n'offre ici que des objets plus bornés & mieux connus, si je dis que ces loix sont les principes sur lesquels est fondé cet art admirable, qui,

lorsque dans le vieillard tous les organes s'affoiblissent , fait rendre à son œil sa première force , lui donner même une force qu'il n'avoit pas reçue de la Nature ; cet art qui étend notre vue jusques dans les derniers lieux de l'espace , qui la porte jusques sur les plus petites parties de la matiere ; & qui nous fait découvrir des objets dont la vue paroissoit interdite aux hommes.

Les loix que suit la lumiere , lorsqu'elle se meut dans un milieu uniforme , ou qu'elle rencontre des corps qu'elle ne sauroit pénétrer , étoient connues des anciens : celle qui marque la route qu'elle suit , lorsqu'elle passe d'un milieu dans un autre , n'est connue que depuis le siècle passé ; Snellius la découvrit ; Descartes entreprit de l'expliquer , Fermat attaqua son explication. Depuis ce temps cette matiere a été l'objet des recherches des plus grands Géometres , sans que jusqu'ici l'on soit parvenu à accorder cette loi avec une autre que la Nature doit suivre encore plus inviolablement.

6 ACCORD DES LOIX

Voici les loix que fuit la lumiere.

La premiere est, que dans un milieu uniforme, elle se meut en ligne droite.

La seconde, que lorsque la lumiere rencontre un corps qu'elle ne peut pénétrer, elle est réfléchië ; & l'angle de sa réflexion est égal à l'angle de son incidence : c'est-à-dire, qu'après sa réflexion elle fait avec la surface du corps un angle égal à celui sous lequel elle l'avoit rencontré.

La troisieme est, que lorsque la lumiere passe d'un milieu diaphane dans un autre, sa route, après la rencontre du nouveau milieu, fait un angle avec celle qu'elle tenoit dans le premier, & le sinus de l'angle de réfraction est toujours dans le même rapport au sinus de l'angle d'incidence. Si, par exemple, un rayon de lumiere passant de l'air dans l'eau s'est brisé de maniere que le sinus de l'angle de sa réfraction soit les trois quarts du sinus de son angle d'incidence ; sous quelque autre obliquité qu'il rencontre la surface de l'eau, le sinus de

la réfraction sera toujours les trois quarts du sinus de la nouvelle incidence.

La première de ces loix est commune à la lumière & à tous les corps : ils se meuvent en ligne droite ; à moins que quelque force étrangère ne les en détourne.

La seconde est encore la même que suit une balle élastique lancée contre une surface inébranlable. La Mécanique démontre qu'une balle qui rencontre une telle surface, est réfléchi par un angle égal à celui sous lequel elle l'avoit rencontrée ; & c'est ce que fait la lumière.

Mais il s'en fait beaucoup que la troisième loi s'explique aussi heureusement. Lorsque la lumière passe d'un milieu dans un autre, les phénomènes sont tout différens de ceux d'une balle qui traverse différens milieux ; & de quelque manière qu'on entreprenne d'expliquer la réfraction, on trouve des difficultés qui n'ont point encore été surmontées.

Je ne citerai point tous les grands

§ ACCORD DES LOIX

hommes qui ont travaillé sur cette matiere; leurs noms feroient une liste nombreuse qui ne seroit qu'un ornement inutile à ce Mémoire; & l'exposition de leurs systêmes formeroit un ouvrage immense: mais je réduirai à trois classes toutes les explications que ces Auteurs ont données de la réflexion & de la réfraction de la lumière.

La premiere classe comprend les explications de ceux qui n'ont voulu déduire la réfraction que des principes les plus simples & les plus ordinaires de la Méchanique.

La seconde comprend les explications qui, outre les principes de la Méchanique, supposent une tendance de la lumière vers les corps, soit qu'on la considere comme une attraction de la matiere, soit comme l'effet de telle cause qu'on voudra.

La troisieme classe enfin comprend les explications qu'on a voulu tirer des seuls principes métaphysiques; de ces loix auxquelles la Nature elle-même paroît avoir été assujettie par

une Intelligence supérieure , qui dans la production de ses effets , la fait toujours procéder de la manière la plus simple.

Descartes , & ceux qui l'ont suivi , font dans la première classe : ils ont considéré le mouvement de la lumière comme celui d'une balle qui rejailliroit à la rencontre d'une surface qui ne lui cede aucunement ; ou qui , en rencontrant une qui lui cede , continueroit d'avancer , en changeant seulement la direction de sa route. Si la manière dont ce grand Philosophe a tenté d'expliquer ces phénomènes est imparfaite , il a toujours le mérite d'avoir voulu ne les déduire que de la Mécanique la plus simple. Plusieurs Mathématiciens releverent quelque paralogisme qui étoit échappé à Descartes ; & firent voir le défaut de son explication.

Newton désespérant de déduire les phénomènes de la réfraction de ce qui arrive à un corps qui se meut contre des obstacles , ou qui est poussé dans des milieux qui lui résistent différem-

ment , eut recours à son attraction. Cette force répandue dans tous les corps à proportion de leur quantité de matiere , une fois admise , il explique de la maniere la plus exacte & la plus rigoureuse les phénomènes de la réfraction. M. Clairaut , dans un excellent Mémoire qu'il a donné sur cette matiere , non seulement a mis dans le plus grand jour l'insuffisance de l'explication cartésienne , mais admettant une tendance de la lumiere vers les corps diaphanes , & la considérant comme causée par quelque atmosphere qui produiroit les mêmes effets que l'attraction , il en a déduit les phénomènes de la réfraction avec la clarté qu'il porte dans tous les sujets qu'il traite.

Fermat avoit senti le premier le défaut de l'explication de Descartes. Il avoit aussi désespéré apparemment de déduire les phénomènes de la réfraction de ceux d'une balle qui seroit poussée contre des obstacles ou dans des milieux résistants ; mais il n'avoit eu recours , ni à des athmo-

sphères autour des corps , ni à l'attraction ; quoiqu'on sache que ce dernier principe ne lui étoit ni inconnu ni désagréable : il avoit cherché l'explication de ces phénomènes dans un principe tout différent & purement métaphysique.

Tout le monde sait que lorsque la lumière ou quelque autre corps va d'un point à un autre par une ligne droite , c'est par le chemin & par le temps le plus court.

On sait aussi , ou du moins on peut facilement savoir , que lorsque la lumière est réfléchie , elle va encore par le chemin le plus court & par le temps le plus prompt. On démontre qu'une balle qui ne doit parvenir d'un point à un autre qu'après avoir été réfléchie par un plan , doit , pour aller par le plus court chemin & par le temps le plus court qu'il soit possible , faire sur ce plan l'angle de réflexion égal à l'angle d'incidence : que si ces deux angles sont égaux , la somme des deux lignes , par lesquelles la balle va & re-

vient , est plus courte & parcourue en moins de temps que toute autre somme de deux lignes qui feroient des angles inégaux.

Voilà donc le mouvement direct & le mouvement réfléchi de la lumière , qui paroissent dépendre d'une loi métaphysique , qui porte que *la Nature , dans la production de ses effets , agit toujours par les moyens les plus simples*. Si un corps doit aller d'un point à un autre sans rencontrer nul obstacle , ou s'il n'y doit aller qu'après avoir rencontré un obstacle invincible , la Nature l'y conduit par le chemin le plus court , & par le temps le plus prompt.

Pour appliquer ce principe à la réfraction , considérons deux milieux pénétrables à la lumière , séparés par un plan qui soit leur surface commune : supposons que le point d'où un rayon de lumière doit partir soit dans un de ces milieux , & que celui où il doit arriver soit dans l'autre ; mais que la ligne qui joint ces points ne soit pas perpendicu-

laire à la surface des milieux : posons encore , par quelque cause que cela arrive , que la lumière se meuve dans chaque milieu avec différentes vitesses. Il est clair que la ligne droite qui joint les deux points sera toujours celle du plus court chemin pour aller de l'un à l'autre , mais elle ne sera pas celle du temps le plus court & ce temps dépendant des différentes vitesses que la lumière a dans les différents milieux , il faut , si le rayon doit employer le moins de temps qu'il est possible , qu'à la rencontre de la surface commune , il se brise d'une manière que la plus grande partie de sa route se fasse dans le milieu où il se meut le plus vite , & la moindre dans le milieu où il se meut le plus lentement.

C'est ce que paroît faire la lumière lorsqu'elle passe de l'air dans l'eau : le rayon se brise de manière que la plus grande partie de sa route se trouve dans l'air , & la moindre dans l'eau. Si donc , comme il étoit assez raisonnable de le supposer , la

lumière se mouvoit plus vite dans les milieux plus rares que dans les plus denses ; si elle se mouvoit plus vite dans l'air que dans l'eau ; elle suivroit ici la route qu'elle doit suivre pour arriver le plus promptement du point d'où elle part au point où elle doit arriver.

Ce fut par ce principe que Fermat résolut le problème ; par ce principe si vraisemblable, que la lumière, qui dans sa propagation & dans sa réflexion va toujours par le temps le plus court qu'il est possible, suivoit encore cette même loi dans sa réfraction ; & il n'hésita pas à croire que la lumière ne se mût avec plus de facilité & plus vite dans les milieux les plus rares, que dans ceux où, pour une même espace, elle trouvoit une plus grande quantité de matière. En effet, pour voit-on croire au premier aspect, que la lumière traverseroit plus facilement & plus vite le cristal & l'eau, que l'air & le vuide ? Il n'en est rien. C'est cependant ce qui arrive.

Descartes avoit avancé le premier que la lumière se mouvoit le plus vite dans les milieux les plus denses : & quoique l'explication de la réfraction , qu'il en avoit déduite , fût insuffisante , son défaut ne venoit point de la supposition qu'il faisoit. Tous les systèmes qui donnent quelque explication plausible des phénomènes de la réfraction , supposent le paradoxe , ou le confirment. Leibnitz voulut concilier le sentiment de Descartes avec les causes finales : mais ce ne fut que par des suppositions insoutenables , & qui ne quadroient plus avec les autres phénomènes de la Nature *.

Ce fait posé , que la lumière se mouvoit le plus vite dans les milieux les plus denses , tout l'édifice que Fermât avoit bâti s'est détruit : la lumière , lorsqu'elle traverse différents milieux , ne va ni par le chemin le plus court , ni par celui du temps le plus prompt , le rayon qui passe de

* V. la remarque de Mr. Euler à la fin de ce chapitre. Les deux autres milieux sont l'air & l'eau.

l'air dans l'eau faisant la plus grande partie de sa route dans l'air, arrive plus tard que s'il n'y faisoit que la moindre. On peut voir dans le Mémoire que M. de Mayran a donné sur la réflexion & la réfraction, l'histoire de la dispute entre Fermat & Descartes, & l'embarras & l'impuissance où l'on a été jusqu'ici pour accorder la loi de la réfraction avec le principe métaphysique.

En méditant profondément sur cette matière, j'ai pensé que la lumière, lorsqu'elle passe d'un milieu dans un autre, abandonnant déjà le chemin le plus court, qui est celui de la ligne droite, pouvoit bien aussi ne pas suivre celui du temps le plus prompt. En effet, quelle préférence devoit-il y avoir ici du temps sur l'espace ? la lumière ne pouvant plus aller tout à la fois par le chemin le plus court, & par celui du temps le plus prompt, pourquoi iroit-elle plutôt par l'un de ces chemins que par l'autre ? Aussi ne suit-elle aucun des deux ; elle

elle prend une route qui a un avantage plus réel : *le chemin qu'elle tient est celui par lequel la quantité d'action est la moindre.*

Il faut maintenant expliquer ce que j'entends par *la quantité d'action*. Lorsqu'un corps est porté d'un point à un autre , il faut pour cela une certaine action : cette action dépend de la vitesse qu'a le corps , & de l'espace qu'il parcourt ; mais elle n'est ni la vitesse ni l'espace pris séparément. La quantité d'action est d'autant plus grande que la vitesse du corps est plus grande , & que le chemin qu'il parcourt est plus long ; elle est proportionnelle à la somme des espaces multipliés chacun par la vitesse avec laquelle le corps les parcourt *.

C'est cela , c'est cette quantité d'action qui est ici la vraie dépense de la Nature ; & ce qu'elle ménage le plus qu'il est possible dans le mouvement de la lumière.

* Comme il n'y a ici qu'un seul corps , on fait abstraction de sa masse.

Soient deux milieux différents , séparés par une surface représentée par la ligne CD , tels que la vitesse de la lumière dans le milieu qui est au dessus , soit comme m , & la vitesse dans le milieu qui est au dessous , soit comme n .

Soit un rayon de lumière , qui partant d'un point donné A , doit parvenir au point donné B : pour trouver le point R où il doit se briser , je cherche le point où le rayon se brisant , la quantité d'action est la moindre : & j'ai $m. AR + n. RB$, qui doit être un *minimum*.

Ou, ayant tiré sur la surface commune des deux milieux , les perpendiculaires AC, BD ; $m\sqrt{(AC^2 + CR^2)} + \sqrt{(BD^2 + DR^2)} = \text{min.}$ Ou, AC & BD étant constants ,


$$\frac{m. CR dCR}{\sqrt{(AC^2 + CR^2)}} + \frac{n. DR dDR}{\sqrt{(BD^2 + DR^2)}} = 0.$$

Mais, CD étant constant , on a $dCR = - dDR$. On a donc

$$\frac{m. CR}{AR} - \frac{n. DR}{BR} = 0. \& \frac{CR}{AR} : \frac{DR}{BR} :: n : m.$$

c'est-à-dire, le sinus d'incidence, au sinus

de réfraction, en raison renversée de la vitesse qu'a la lumière dans chaque milieu.



Tous les phénomènes de la réfraction s'accordent maintenant avec le grand principe, que la Nature, dans la production de ses effets, agit toujours par les voies les plus simples. De ce principe suit, que lorsque la lumière passe d'un milieu dans un autre, le sinus de son angle de réfraction est au sinus de son angle d'incidence en raison inverse des vitesses qu'a la lumière dans chaque milieu.

Mais ce fonds, cette quantité d'action, que la Nature épargne dans le mouvement de la lumière à travers différents milieux, le ménage-t-elle

également lorsqu'elle est réfléchie par des corps opaques , & dans sa simple propagation ? Oui , cette quantité est toujours la plus petite qu'il est possible.

Dans les deux cas de la réflexion & de la propagation , la vitesse de la lumière demeurant la même , la plus petite quantité d'action donne en même temps le chemin le plus court , & le temps le plus prompt. Mais ce chemin le plus court & le plutôt parcouru n'est qu'une conséquence de la plus petite quantité d'action : & c'est cette conséquence que Fermat avoit prise pour le principe.

Le vrai principe une fois découvert , j'en déduis toutes les loix que suit la lumière , soit dans sa propagation , dans sa réflexion , ou dans sa réfraction.

Je connois la répugnance que plusieurs Mathématiciens ont pour les *causes finales* appliquées à la Physique , & l'approuve même jusqu'à un certain point ; j'avoue que ce n'est pas sans péril qu'on les introduit : l'er-

reur où sont tombés des hommes tels que Fermat en les suivant ne prouve que trop combien leur usage est dangereux. On peut cependant dire que ce n'est pas le principe qui les a trompés , c'est la précipitation avec laquelle ils ont pris pour le principe ce qui n'en étoit que des conséquences.

On ne peut douter que toutes choses ne soient réglées par un Etre suprême , qui , pendant qu'il a imprimé à la matiere des forces qui dénotent sa puissance , l'a destinée à exécuter des effets qui marquent sa sagesse : & l'harmonie de ces deux attributs est si parfaite , que sans doute tous les effets de la Nature se pourroient déduire de chacun pris séparément. Une Mécanique aveugle & nécessaire suit les desseins de l'Intelligence la plus éclairée & la plus libre ; & si notre esprit étoit assez vaste , il verroit également les causes des effets physiques , soit en calculant les propriétés des corps , soit en recherchant ce qu'il y avoit de plus convenable à leur faire exécuter.

Le premier de ces moyens est le plus à notre portée , mais il ne nous mène pas fort loin. Le second quelquefois nous égare , parce que nous ne connoissons point assez quel est le but de la Nature , & que nous pouvons nous méprendre sur *la quantité*, que nous devons regarder comme *sa dépense* dans la production de ses effets.

Pour joindre l'étendue à la sûreté dans nos recherches , il faut employer l'un & l'autre de ces moyens. Calculons les mouvements des corps , mais consultons aussi les desseins de l'Intelligence qui les fait mouvoir.

Il semble que les anciens Philosophes aient fait les premiers essais de cette espece de Mathématique : ils ont cherché des rapports métaphysiques dans les propriétés des nombres & des corps ; & quand ils ont dit que l'occupation de Dieu étoit la Géométrie , ils ne l'ont entendu sans doute que de cette science qui compare les ouvrages de sa puissance avec les vues de sa sagesse.

Trop peu Géometres pour l'entreprise qu'ils formoient, ce qu'ils nous ont laissé est peu fondé, ou n'est pas intelligible. La perfection qu'a acquis l'art depuis eux nous met mieux à portée de réussir ; & fait peut-être plus que la compensation de l'avantage que ces grands génies avoient sur nous.

NB. Lorsque nous lûmes le *Mémoire précédent dans l'Académie R. des Sciences de Paris*, nous ne connoissions ce que Leibnitz avoit fait sur cette matiere que par ce qu'en dit M. de Mayran dans son *Mémoire sur la réflexion des corps*, *Mém. de l'Acad. de Paris*, année 1723. Nous avions confondu comme lui ce sentiment de Leibnitz avec celui de Fermat : voici ce sentiment développé, tiré d'un *Mémoire de M. Euler*, tome VII. des *Mém. de l'Acad. R. des Sciences de Berlin*.

L Leibnitz aussi a tâché de renverser l'explication de Fermat. Dans les Actes de Leipzig, 1682. il s'est proposé pour la réfraction de la lumière, de rappeler dans la Philosophie ces causes finales

qui en avoient été bannies par Descartes, & de rétablir l'explication que Descartes avoit déduite de la collision des corps, à laquelle le sentiment de Fermat étoit contraire. Il commence donc par nier que la Nature affecte, soit la route la plus courte, soit celle du moindre temps; mais prétend qu'elle choisit la route la plus facile, qu'il ne faut confondre avec aucune des deux. Or pour estimer cette route la plus facile, c'est la résistance avec laquelle les rayons de la lumière traversent les milieux diaphanes, qu'il considère; & il suppose cette résistance différente dans les différents milieux. Il établit même, ce qui paroît favoriser l'opinion de Fermat, que dans les milieux les plus denses, comme l'eau & le verre, la résistance est plus grande que dans l'air & les autres milieux plus rares. Cela supposé, il considère la difficulté que trouve un rayon, lorsqu'il traverse quelque milieu, & estime cette difficulté par le chemin multiplié par la résistance. Il prétend que le rayon suit toujours cette route, dans laquelle la somme des difficultés ainsi évaluée est la plus petite: & par la méthode de *maximis* & *minimis*, il trouve la règle que l'expérience a fait connoître. Mais, quoique cette explication au premier coup d'œil semble s'accorder avec celle de Fermat, elle est cependant ensuite interprétée avec une subtilité si merveilleuse, qu'elle lui est diamétralement opposée, & qu'elle s'accorde avec celle de Descartes. Car, quoique *Leibnitz* ait supposé la résistance du verre plus grande que celle de l'air, il prétend cependant que les rayons se meuvent plus vite dans le verre que dans l'air;

& pour cela même , que la résistance du verre est la plus grande : ce qui assurément est un insigne paradoxe. Or voici comme il s'y prend pour le soutenir. Il dit qu'une plus grande résistance empêche la diffusion des rayons , au lieu que les rayons se dispersent davantage là où la résistance est moindre ; & que la diffusion étant empêchée , les rayons resserrés dans leur passage , tels qu'un fleuve qui coule dans un lit plus étroit , en acquierent une plus grande vitesse. Ainsi l'explication de *Leibnitz* s'accorde avec celle de Descartes , en ce que l'un & l'autre donnent aux rayons une plus grande vitesse dans le milieu le plus dense : mais elle s'en écarte fort par la cause que chacun assigne pour cette plus grande vitesse ; puisque Descartes croyoit que les rayons se mouvoient avec le plus de vitesse dans le milieu le plus dense , parce que la résistance y étoit moindre ; & que *Leibnitz* au contraire attribue cette plus grande vitesse à une plus grande résistance. Si ce sentiment peut être admis ou non , ce n'est pas ce que j'examine ici ; mais ce que je dois remarquer , c'est que , quoique *Leibnitz* semble vouloir regarder ce principe de la route la plus facile comme universel , cependant il ne l'a jamais appliqué à aucun autre cas , ni enseigné comment dans d'autres cas cette difficulté , qu'il falloit faire un *minimum* , devoit être estimée. S'il dit , comme ici , que c'est par le produit de la route décrite multipliée par la résistance ; dans la plupart des cas il sera absolument impossible de définir ce qu'on doit entendre par la résistance , qui est un terme très-vague ; & lors-

qu'il n'y aura aucune résistance , comme dans le mouvement des corps célestes , comment cette difficulté devra-t-elle être estimée ? Sera-ce par la seule route décrite , puisque la résistance étant nulle , on pourroit la regarder comme par-tout la même ? Mais alors il s'ensuivroit que , dans ces mouvements , la route elle-même décrite devoit être le *minimum* ; & par conséquent la ligne droite : ce qui est entièrement contraire à l'expérience. Si au contraire le mouvement se fait dans un milieu résistant , dira-t-il que ce mouvement sera tel , que le produit de la route décrite multipliée par la résistance soit un *minimum* ? On tireroit de là les conclusions les plus absurdes. On voit donc clairement que le principe de la route la plus facile , tel qu'il a été proposé & expliqué par *Leibnitz* , ne sauroit s'appliquer à aucun autre phénomène qu'à celui du mouvement de la lumière.

Il semble cependant qu'on pourroit rendre ce principe beaucoup plus étendu , par l'interprétation qu'on donneroit aux remarques qui suivent. Car *Leibnitz* supposant que les rayons se meuvent d'autant plus vite , qu'ils trouvent une plus grande résistance ; dans ce cas , la vitesse seroit proportionnelle à la résistance , & pourroit être prise pour sa mesure ; & l'estimation de la difficulté , selon que *Leibnitz* l'a faite , se réduiroit au produit de la route décrite multipliée par la vitesse ; ce qui étant supposé un *minimum* , s'accorderoit avec le principe de *M. de Maupertuis* , qui estime la quantité d'action par le même produit de l'espace multiplié par la vitesse. Comme donc ce produit ,

non seulement dans le mouvement des rayons , mais dans tous les mouvements & dans toutes les opérations de la Nature , devient en effet le plus petit possible , & que c'est en cela que consiste le principe de la moindre action ; on pourroit d'abord penser que *Leibnitz* avoit en vue ce principe , qui s'accordoit avec son principe de la route la plus facile. Mais quand nous admettrions sans aucune exception le raisonnement de *Leibnitz* , par lequel il veut prouver qu'une plus grande résistance augmente la vitesse , personne cependant ne pourra jamais croire que dans tout mouvement il arrive que la vitesse croisse avec la résistance ; y ayant dans la Nature une infinité d'exemples où le contraire saute aux yeux , & où la résistance diminue la vitesse. C'est donc par un pur hazard qu'il arrive ici que le principe du chemin le plus facile s'accorde avec celui de la moindre action ; ainsi qu'il arrive que le principe de *Ptolémée* du chemin le plus court dans l'Optique & dans la Catoptrique , s'accorde encore avec ce même principe : quoique ce ne soit que dans ce principe même qu'il faille chercher la raison de ces phénomènes. Ainsi , lorsque *Leibnitz* donne son principe du chemin le plus facile pour une loi universelle de la Nature , & fait la difficulté proportionnelle au produit du chemin par la résistance , il ne sauroit accorder cela avec le principe de la moindre action dans aucun autre cas que dans ceux où la vitesse croît proportionnellement avec la résistance : cas qui sont assurément bien rares , si l'on n'ose pas dire qu'il ne s'en trouve aucun.

Dans tous les autres cas donc , le principe


du chemin le plus facile différera beaucoup du principe de la moindre action ; & *Leibnitz* se feroit contredit lui-même s'il avoit jamais prétendu que, dans les opérations de la Nature, le produit du chemin décrit multiplié par la vitesse faisoit un *minimum* ; excepté les seuls cas où la vitesse feroit proportionnelle à la résistance. D'où nous concluons avec assurance que le principe de la moindre action, non seulement a été entièrement inconnu à *Leibnitz* ; mais encore qu'il a employé un principe fort différent, qui ne s'accordoit avec celui-là que dans un très-petit nombre de cas très-singuliers ; pendant que, dans une infinité d'autres, il lui étoit manifestement contraire. Mais de plus ce principe de *Leibnitz*, quelque général qu'il paroisse, n'est d'usage que dans fort peu de cas, & ne l'est peut-être que dans les seuls dont nous avons parlé. Dans tous les autres on ne peut pas même l'appliquer, parce qu'on ne sait pas comment mesurer la résistance ; & que, de quelque manière qu'on la mesurât, elle jetteroit toujours dans de grandes erreurs. Tant s'en faut donc que *Leibnitz* ait jamais eu le principe de la moindre quantité d'action, qu'au contraire il a eu un principe tout opposé, dont l'usage, excepté dans un seul cas, n'étoit jamais applicable, ou conduisoit à l'erreur. Et l'on ne voit pas aussi que *Leibnitz* ait voulu dans aucun autre cas faire l'application de ce principe.

F I N.

R E C H E R C H E
D È S L O I X
DU MOUVEMENT.

Mens agitat molem.

Virgil. *Æneid.* lib. VI.





R E C H E R C H E

D E S L O I X

D U M O U V E M E N T . *

L E s corps , soit en repos , soit en mouvement , ont une certaine force pour persister dans l'état où ils sont : cette force appartenant à toutes les parties de la matière , est toujours proportionnelle à la quantité de matière que ces corps contiennent , & s'appelle leur *inertie*.

L'impénétrabilité des corps , & leur inertie , rendoient nécessaire l'établissement de quelques loix , pour accorder ensemble ces deux propriétés , qui sont à tout moment opposées l'une à l'autre dans la Nature. Lorsque deux

* Lu dans l'Académie Royale des Sciences de Berlin en 1746.

corps se rencontrent , ne pouvant se pénétrer , il faut que le repos de l'un & le mouvement de l'autre , ou le mouvement de tous les deux , soient altérés : mais cette altération dépendant de la force avec laquelle les deux corps se choquent , examinons ce que c'est que le choc , voyons de quoi il dépend ; & si nous ne pouvons avoir une idée assez claire de la force , voyons du moins les circonstances qui le rendent le même.

On suppose ici , comme l'ont supposé tous ceux qui ont cherché les loix du mouvement , que les corps soient des globes de matiere homogene ; & qu'ils se rencontrent directement , c'est-à-dire , que leurs centres de gravité soient dans la ligne droite qui est la direction de leur mouvement.

Si un corps se mouvant avec une certaine vitesse , rencontre un autre corps en repos , le choc est le même que si ce dernier corps se mouvant avec la vitesse du premier , le rencontroit en repos.

Si deux corps se mouvant l'un vers
l'autre

l'autre se rencontrent , le choc est le même que si l'un des deux étant en repos , l'autre le rencontroit avec une vitesse qui fût égale à la somme des vitesses de l'un & de l'autre.

Si deux corps se mouvant vers le même côté se rencontrent , le choc est le même que si l'un des deux étant en repos , l'autre le rencontroit avec une vitesse qui fût égale à la différence des vitesses de l'un & de l'autre.

En général donc : si deux corps se rencontrent , soit que l'un des deux soit en repos , soit qu'ils se meuvent tous les deux l'un vers l'autre , soit qu'ils se meuvent tous deux du même côté ; quelles que soient leurs vitesses , si la somme ou la différence de ces vitesses (ce qu'on appelle *la vitesse respective*) est la même , le choc est le même. *La grandeur du choc de deux corps donnés dépend uniquement de leur vitesse respective.*

La vérité de cette proposition est facile à voir , en concevant les deux corps emportés sur un plan mobile , dont la vitesse détruisant la vitesse de l'un des deux , donneroit à l'autre la somme

ou la différence des vitesses qu'ils avoient. Le choc des deux corps sur ce plan seroit le même que sur un plan immobile, où l'un des corps étant en repos, l'autre le viendroit frapper avec la somme ou la différence des vitesses.

Voyons maintenant la différence que la dureté ou l'élasticité des corps cause dans les effets du choc.

Les corps parfaitement durs sont ceux dont les parties sont inséparables & inflexibles ; & dont, par conséquent, la figure est inaltérable.

Les corps parfaitement élastiques sont ceux dont les parties, après avoir été plies, se redressent, reprenant leur première situation, & rendent aux corps leur première figure. Quant à la nature de cette élasticité, nous n'entreprenons pas de l'expliquer ; il suffit ici d'en connoître l'effet.

Je ne parle point des corps mous, ni des corps fluides ; ce ne sont que des amas de corps durs ou élastiques. Lorsque deux corps durs se rencontrent ; leurs parties étant inséparables & inflexibles, le choc ne sauroit altérer

que leurs vitesses. Et comme ces corps ne peuvent se pénétrer, il faut que leur vitesse devienne la même; il faut que les corps durs, après le choc, aillent ensemble d'une vitesse commune.

Mais lorsque deux corps élastiques se rencontrent, pendant qu'ils se pressent & se poussent, le choc est employé aussi à plier leurs parties; & les deux corps ne demeurent appliqués l'un contre l'autre que jusqu'à ce que leur ressort, bandé par le choc autant qu'il le peut être, les sépare en se débandant, & les fasse s'éloigner avec autant de vitesse qu'ils s'approchoient: car la vitesse respective des deux corps étant la seule cause qui avoit bandé leur ressort, il faut que le débandement produise un effet égal à celui qui, comme cause, avoit produit le bandement; c'est-à-dire, une vitesse respective en sens contraire égale à la première. La vitesse respective des corps élastiques est donc, après le choc, la même qu'auparavant.

Cherchons maintenant les loix selon

lesquelles le mouvement se distribue entre deux corps qui se choquent , soit que ces corps soient durs , soit qu'ils soient élastiques.

PRINCIPE GÉNÉRAL.

Lorsqu'il arrive quelque changement dans la Nature , la quantité d'action , nécessaire pour ce changement , est la plus petite qu'il soit possible.

La quantité d'action est le produit de la masse des corps , par leur vitesse & par l'espace qu'ils parcourent. Lorsqu'un corps est transporté d'un lieu dans un autre , l'action est d'autant plus grande , que la masse est plus grosse , que la vitesse est plus rapide , que l'espace par lequel il est transporté est plus long.

PROBLÈME.

Trouver les loix du mouvement des corps :

POUR LES CORPS DURS.

Soient deux corps durs , dont les masses sont A & B , qui se meuvent vers le même côté , avec les vitesses

a & b : mais A plus vîte que B , enforte qu'il l'atteigne & le choque. Soit la vîtesse commune de ces deux corps après le choc $= x < a & > b$. Le changement arrivé dans l'Univers consiste en ce que le corps A , qui se mouvoit avec la vîtesse a , & qui dans un certain temps parcouroit un espace $= a$, ne se meut plus qu'avec la vîtesse x , & ne parcourt qu'un espace $= x$: le corps B , qui ne se mouvoit qu'avec la vîtesse b , & ne parcouroit qu'un espace $= b$, se meut avec la vîtesse x , & parcourt un espace $= x$.

Ce changement est donc le même qui seroit arrivé, si pendant que le corps A se mouvoit avec la vîtesse a , & parcouroit l'espace $= a$, il eût été emporté en arriere sur un plan immatériel, qui se fût mu avec une vîtesse $a - x$, par un espace $= a - x$: & que pendant que le corps B se mouvoit avec la vîtesse b , & parcouroit l'espace $= b$, il eût été emporté en avant sur un plan immatériel, qui se fût mu avec une vîtesse $x - b$, par un espace $= x - b$.

Or, que les corps A & B se meu-

38 LOIX DU MOUVEMENT.

vent avec des vitesses propres sur les plans mobiles, ou qu'ils y soient en repos, le mouvement de ces plans chargés des corps étant le même; les quantités d'action, produites dans la Nature, seront $A(a-x)^2$, & $B(x-b)^2$; dont la somme doit être la plus petite qu'il soit possible. On a donc

$$A a a - 2 A a x + A x x + B x x - 2 B b x + B b b = \text{min.}$$

Où

$$- 2 A a dx + 2 A x dx + 2 B x dx - 2 B b dx = 0. \text{ D'où l'on tire pour la vitesse commune}$$

$$x = \frac{Aa + Bb}{A + B}.$$

Dans ce cas, où les deux corps se meuvent du même côté, la quantité de mouvement détruite & la quantité produite sont égales; & la quantité totale de mouvement demeure, après le choc, la même qu'elle étoit auparavant.

Il est facile d'appliquer le même raisonnement au cas où les corps se meuvent l'un vers l'autre: ou bien il suffit de considérer b comme négatif par

rapport à u & la vitesse commune sera

$$x = \frac{Aa - Bb}{A + B}.$$

Si l'un des corps étoit en repos avant le choc, $b = 0$; & la vitesse commune est

$$x = \frac{Au}{A + B}.$$

Si un corps rencontre un obstacle inébranlable, on peut considérer cet obstacle comme un corps d'une masse infinie en repos : si donc B est infini, la vitesse $x = 0$.

Voyons maintenant ce qui doit arriver lorsque les corps sont élastiques. Les corps dont je vais parler sont ceux qui ont une parfaite élasticité.

POUR LES CORPS ÉLASTIQUES.

Soient deux corps élastiques, dont les masses sont A & B , qui se meuvent vers le même côté, avec les vitesses a & b ; mais A plus vite que B , en sorte qu'il l'atteigne & le choque : & soient α & β les vitesses des deux corps après le choc, la somme ou la différence de ces vitesses, après le choc, est la même qu'elle étoit auparavant.

Le changement arrivé dans l'Univers consiste en ce que le corps A , qui se mouvoit avec la vitesse a , & qui dans un certain temps parcouroit un espace $= a$, ne se meut plus qu'avec la vitesse a , & ne parcourt qu'un espace $= a$: le corps B , qui ne se mouvoit qu'avec la vitesse b , & ne parcouroit qu'un espace $= b$, se meut avec la vitesse β , & parcourt un espace $= \beta$.

Ce changement est donc le même qui seroit arrivé, si pendant que le corps A se mouvoit avec la vitesse a , & parcouroit l'espace $= a$, il eût été emporté en arrière sur un plan immatériel, qui se fût mu avec une vitesse $a - a$, par un espace $= a - a$: & que pendant que le corps B se mouvoit avec la vitesse b , & parcouroit l'espace $= b$, il eût été emporté en avant sur un plan immatériel, qui se fût mu avec une vitesse $\beta - b$, par un espace $= \beta - b$.

Or, que les corps A & B se meuvent avec des vitesses propres sur les plans mobiles, ou qu'ils y soient en

repos ; le mouvement de ces plans chargés des corps étant le même , les quantités d'action produites dans la Nature seront $A (a - a)^2$, & $B (\beta - b)^2$; dont la somme doit être la plus petite qu'il soit possible. On a donc

$$A a a - 2 A a a + A a a + B \beta \beta - 2 B b \beta + B b b = \min.$$

Ou

$$-2 A a d a + 2 A a d a + 2 B \beta d \beta - 2 B b d \beta = 0.$$

Or pour les corps élastiques , la vitesse respective étant , après le choc , la même qu'elle étoit auparavant ; on a $\beta - a = a - b$, ou $\beta = a + a - b$, & $d \beta = d a$: qui , étant substitués dans l'équation précédente , donnent pour les vitesses

$$a = \frac{A a - B a + 2 B b}{A + B} ; \& \beta = \frac{2 A a - A b + B b}{A + B} .$$

Si les corps se meuvent l'un vers l'autre , il est facile d'appliquer le même raisonnement : ou bien il suffit de considérer b comme négatif par rapport à a , & les vitesses seront

$$a = \frac{A a - B a - 2 B b}{A + B} ; \& \beta = \frac{2 A a + A b - B b}{A + B} .$$

42 LOIX DU MOUVEMENT.

Si l'un des corps étoit en repos avant le choc, $b = 0$, & les vitesses sont

$$a = \frac{Aa - Ba}{A + B}; \text{ \& } \beta = \frac{2Aa}{A + B}.$$

Si l'un des corps est un obstacle inébranlable, considérant cet obstacle comme un corps B d'une masse infinie en repos; on aura la vitesse $a = -a$: c'est-à-dire que le corps A rejaillira avec la même vitesse qu'il avoit en frappant l'obstacle.

Si l'on prend la somme des forces vives, on verra qu'après le choc elle est la même qu'elle étoit auparavant: c'est-à-dire, que

$$Aaa + B\beta\beta = Aaa + Bbb.$$

Ici la somme des forces vives se conserve après le choc: mais cette conservation n'a lieu que pour les corps élastiques, & non pour les corps durs. Le principe général, qui s'étend aux uns & aux autres, est que la quantité d'action, nécessaire pour causer quelque changement dans la Nature, est la plus petite qu'il est possible.

LOI DU REPOS.

..... *Immota manere*

Mens jubet.

CONCLUSION

1. The first group of variables is the set of variables that are used to describe the individual's characteristics. These variables are: age, sex, education, income, and occupation. The second group of variables is the set of variables that are used to describe the individual's health status. These variables are: self-rated health, physical health, and mental health. The third group of variables is the set of variables that are used to describe the individual's social support. These variables are: social support, social network, and social capital. The fourth group of variables is the set of variables that are used to describe the individual's health behaviors. These variables are: smoking, drinking, and exercise. The fifth group of variables is the set of variables that are used to describe the individual's health outcomes. These variables are: mortality, morbidity, and quality of life.

1. *Phragmites* (common)

100

LOI DU REPOS*

SI les Sciences sont fondées sur certains principes simples & clairs dès le premier aspect, d'où dépendent toutes les vérités qui en sont l'objet, elles ont encore d'autres principes, moins simples à la vérité, & souvent difficiles à découvrir, mais qui étant une fois découverts, sont d'une très-grande utilité. Ceux-ci sont en quelque façon les loix que la Nature suit dans certaines combinaisons de circonstances, & nous apprennent ce qu'elle fera dans de semblables occasions. Les premiers principes n'ont guère besoin de démonstration, par l'évidence dont ils sont dès que l'esprit les examine; les derniers ne sauroient avoir de démonstration générale, parce qu'il est impossible de parcourir généralement tous les cas où ils ont lieu.

Tel est, par exemple, le principe si connu & si utile dans la Statique ordinaire; que dans tous les assemblages de corps, leur commun centre de gravité descend le plus bas qu'il est possible. Tel

* Ce Mémoire fut lu dans l'Académie R. des Sciences de Paris le 20. Février 1740.

est celui de la conservation des forces vives. Jamais on n'a donné de démonstration générale à la rigueur de ces principes ; mais jamais personne , accoutumé à juger dans les Sciences , & qui connoît la force de l'induction , ne doutera de leur vérité. Quand on aura vu que dans mille occasions la Nature agit d'une certaine manière , il n'y a point d'homme de bon sens qui croie que dans la mille-unième elle suivra d'autres loix.

Quant aux démonstrations *a priori* de ces sortes de principes , il ne paroît pas que la Physique les puisse donner ; elles semblent appartenir à quelque science supérieure. Cependant leur certitude est si grande , que plusieurs Mathématiciens n'hésitent pas à en faire les fondemens de leurs théories , & s'en servent tous les jours pour résoudre des problèmes , dont la solution leur coûteroit sans eux beaucoup plus de peine. Notre esprit étant aussi peu étendu qu'il l'est , il y a souvent trop loin pour lui des premiers principes au point où il veut arriver , & il se laisse ou s'écarter de sa route. Ces loix dont nous passons le dispensent d'une partie

du chemin : il part de là avec toutes ses forces , & souvent n'a plus que quelques pas à faire pour arriver là où il desire.

Il n'y a point de science où l'on sente plus le besoin de ces principes ; que dans la Statique & la Dynamique : la complication qui s'y trouve de la force avec la matiere , y rend plus nécessaires que dans les Sciences simples , ces asyles pour les esprits fatigués , ou égares dans leurs recherches. Ils voient facilement s'ils se sont trompés dans leurs propositions , en examinant si le principe s'y retrouve , ou non.


Ce n'est que dans ces derniers temps qu'on a découvert une loi dont on ne sauroit trop vanter la beauté & l'utilité : c'est que dans tout système de corps élastiques en mouvement , qui agissent les uns sur les autres , la somme des produits de chaque masse par le quarré de sa vitesse ; ce qu'on appelle la force vive , demeure inaltérablement la même.

En méditant sur la nature de l'équilibre , j'ai cherché s'il n'y auroit pas dans la Statique quelque loi de cette espece ; s'il n'y auroit pas pour les corps tenus en repos par des forces une loi générale ,

nécessaire pour leur repos ; & voici celle que j'ai trouvée que la Nature observe.

Soit un système de corps qui pesent , ou qui sont tirés vers des centres par des forces qui agissent chacune sur chacun , comme une puissance N de leurs distances aux centres : pour que tous ces corps demeurent en repos , il faut que la somme des produits de chaque masse , par l'intensité de sa force , & par la puissance $N + 1$ de sa distance au centre de sa force (qu'on peut appeller la somme des forces du repos) fasse un maximum ou un minimum.

Démonst. 1^o. Soit un système d'un nombre quelconque de points pesants , ou de corps dont les masses soient fort petites par rapport à la distance où ils sont des centres vers lesquels ils pesent. Soient ces corps M, M', M'' , &c. attachés à des rayons immatériels CM, CM', CM'' , mobiles autour du point fixe C . Soient leurs masses $= m, m', m''$; & soient dans un nombre égal de points , F, F', F'' , des forces f, f', f'' , qui s'exercent sur chacun des corps , chacune comme une puissance n de la distance $FM,$




$FM, FM', FM'' = \zeta, \zeta', \zeta''$, chaque force n'ayant de pouvoir que sur son corps.

Soient prolongés les rayons CM ; & tirées des points F , les perpendiculaires FG , l'on aura (par la décomposition des forces) $m f \zeta^n \times \frac{FG}{FM}$, pour la force motrice qui tire le rayon CM perpendiculairement; & cette force multipliée par la longueur du levier CM , sera $m f \zeta^n \times \frac{FG}{FM} CM$, pour celle qui tend à faire tourner ce levier, & ainsi des autres.

Considérant donc maintenant tout le système dans la situation prochaine, & les corps en μ, μ', μ'' : ayant tiré les lignes $F\mu$, & des centres F décrit les petits arcs MK , on aura $\frac{FG}{FM} = \frac{MK}{M\mu}$, qui substitué dans les forces motrices à la place de $\frac{FG}{FM}$, donne $m f \zeta^n \times \frac{MK}{M\mu} CM$, pour chaque corps. Et la raison de CM à $M\mu$ étant pour tous les corps la même, & multipliant tous les pro-

LOI DU REPOS. 11



D ij


32 LOI DU REPOS.

duits ; on aura , pour que le système soit en équilibre , $mfz^n dz + m'f'z'^n dz' + m''f''z''^n dz'' = 0$. D'où l'on voit que $mfz^{n+1} + m'f'z'^{n+1} + m''f''z''^{n+1}$ étoit un *maximum* ou un *minimum*.
C. Q. F. D.

2°. Si les corps , au lieu d'être attachés à des rayons inflexibles , sont attachés à des cordes unies en C : soit le système prêt à parvenir dans la situation nouvelle $\mu \gamma \mu' \gamma \mu'' \gamma$; & soit tirée par C & γ la droite indéfinie $C \gamma$. Rapportant à cette direction les efforts de chaque corps l'un contre les autres , & tirant des points M , les perpendiculaires MP , $M'P'$, $M''P''$, sur cette ligne, il faut , pour qu'il y ait équilibre entre ces corps ,

$$\text{que } mfz^n \times \frac{CP}{CM} = \\ m'f'z'^n \times \frac{CP'}{CM'} + m''f''z''^n \times \frac{CP''}{CM''}.$$

Décrivant maintenant des centres F & des rayons $F \gamma$, $F' \gamma$, $F'' \gamma$, les petits arcs γK , $\gamma K'$, $\gamma K''$, on peut pour $\frac{CP}{CM}$, $\frac{CP'}{CM'}$, $\frac{CP''}{CM''}$, mettre $\frac{CK}{C\gamma}$, $\frac{CK'}{C\gamma}$, $\frac{CK''}{C\gamma}$,



dans l'équation précédente ; & l'on aura

$$mfz^n \times CK = \\ m'f'z'^n \times CK' + m''f''z''^n \times CK''.$$

Mais les cordes étant unies en C ; CK, CK', CK'', sont les quantités dont les corps se sont approchés ou éloignés de leurs centres, c'est-à-dire, sont dz , dz' , dz'' : mettant donc dans l'équation précédente ces valeurs, on a

$$mfz^n dz = m'f'z'^n dz' + m''f''z''^n dz''.$$

D'où l'on voit que


$$mfz^{n+1} + m'f'z'^{n+1} + m''f''z''^{n+1}$$

étoit un *maximum* ou un *minimum*.
C. Q. F. D.

SCHOLIE.

Si l'on considère maintenant tous les lieux des forces réunis , & toutes les forces réunies dans un seul point , & cette force qui en est le résultat comme constante , & agissant sur tous les corps ; on voit que le système sera en équilibre lorsque la somme des corps multipliés chacun par sa distance au centre de force fera un *maximum* ou un *minimum*.

LOI DU REPOS. 33




Et si l'on suppose ce centre de force à une distance infinie du système, il est clair que pour que le système soit en équilibre, il faut que le centre de gravité de tous les corps soit le plus bas ou le plus haut qu'il soit possible, ou le plus près ou le plus loin du centre de force. Et ce principe fondamental de la Statique ordinaire n'est qu'une suite & un cas particulier du nôtre.

On a sur le champ par ce théorème la solution de plusieurs questions de Mécanique qui ont autrefois arrêté d'habiles Géomètres, & dont ils n'ont donné que des solutions particulières, qui leur ont coûté bien de la peine & de grandes longueurs. *

Soit, par exemple, le levier droit ACB , mobile autour du point C , & chargé de deux corps A & B , dont les masses soient fort petites par rapport à leur distance du point F vers lequel ils pesent; & soit en F une force quelconque p , dont l'action sur eux soit proportionnelle à une puissance n de leur distance à ce point: on demande quelle sera la situation d'équilibre.

* Voy. Fermat oper. mathem. Et la Méchan. de M. Varignon, sect. V.

Soient tirées par les points F & C , la droite indéfinie FP , les lignes FA , FB , & abaissées des points A & B sur FP , les perpendiculaires AP , BQ ; soient les lignes $CA = a$, $CB = b$, $CF = c$, $CP = x$, & les masses des deux corps $= A$ & $= B$;



on aura $FA = \sqrt{cc + aa + 2cx}$ &

$FB = \sqrt{cc + bb - \frac{2bcx}{a}}$.

Maintenant par notre théorème, pour qu'il y ait équilibre, il faut que

$$p A (cc + aa + 2cx)^{\frac{n+1}{2}} \\ + p B (cc + bb - \frac{2bc}{a}x)^{\frac{n+1}{2}}$$

fasse un *maximum* ou un *minimum*.

On a donc

$$p A (cc + aa + 2cx)^{\frac{n-1}{2}} c dx = \\ p B (cc + bb - \frac{2bc}{a}x)^{\frac{n-1}{2}} \frac{bcdx}{a};$$

$$\text{Ou } Aa(cc + aa + 2cx)^{\frac{n-1}{2}} = \\ Bb(cc + bb - \frac{2bc}{a}x)^{\frac{n-1}{2}};$$

D'où l'on tire $x =$

$$\frac{a}{2c} \times \frac{B^{\frac{2}{n-1}} b^{\frac{2}{n-1}} (cc + bb) - A^{\frac{2}{n-1}} a^{\frac{2}{n-1}} (cc + aa)}{A^{\frac{2}{n-1}} a^{\frac{n+1}{n-1}} + B^{\frac{2}{n-1}} b^{\frac{n+1}{n-1}}}.$$


Prenant CP égale à cette valeur de x , & tirant par le point P la perpendiculaire PA , le point où le levier BA la rencontrera, donnera la situation d'équilibre.

L'équation

$$Aa(cc + aa + 2cx)^{\frac{n-1}{2}} =$$

$$Bb(cc + bb - \frac{2bc}{a}x)^{\frac{n-1}{2}} :$$

fait voir que :



Si le centre de la force est à une distance infinie , comme on le suppose pour tous les corps pesants qu'on examine dans la Mécanique ordinaire ; il est clair que quelle que soit la puissance de la distance selon laquelle cette force agit , les termes aa , bb ,

& ceux où est x , s'évanouissent devant cc ; & il suffit pour qu'il y ait équilibre, que $Aa = Bb$: c'est-à-dire, que les masses des deux corps soient en raison renversée des bras du levier; & l'équilibre subsistera dans toutes les situations du levier, puisqu'il est indépendant de x .

Si $n = 1$, c'est-à-dire, si la force agit en raison directe de la distance au centre K ; on a encore, pour la condition d'équilibre, $Aa = Bb$. D'où l'on voit que dans cette hypothèse il y a encore un point C autour duquel le système des deux corps est toujours en équilibre, s'il y a été une fois; c'est-à-dire, qu'il y a dans ces deux hypothèses un centre de gravité toujours le même dans toutes les situations.


Mais hors de ces deux hypothèses, on voit par la loi du repos, qu'il est impossible qu'il y ait de pareil centre. Et la simplicité de l'équation

$$Aa(cc + aa + 2cx)^{\frac{n-1}{2}} =$$

$$Bb(cc + bb - \frac{2bc}{a}x)^{\frac{n-1}{2}},$$

ne donne pour le levier que deux situations d'équilibre, l'une à droite & l'autre à gauche.

Il y a cependant encore deux situations où les corps demeureront dans une espee d'équilibre ; ce sont celles où ces deux corps



se trouvent dans la ligne qui passe par le centre de force & par le point d'appui.

Quoique l'équation précédente ne donne pas ces deux situations, elles sont cependant contenues dans la loi du repos, & dans la premiere équation qui en résulte, dans laquelle elles sont données par $dx = 0$.

On voit facilement que si la pesanteur est uniforme, comme on le suppose dans la Méchanique ordinaire, & se fait vers le centre de la Terre, il n'y a point à la rigueur, de centre de gravité dans les corps, c'est-à-dire, de point par où étant suspendus, ils se tiennent indifféremment dans toutes les situations; quoiqu'il y ait dans ces corps un point qu'on peut prendre physiquement pour ce centre, à cause de la petitesse dont sont les corps & les leviers qui sont l'objet de la Méchanique ordinaire par rapport à la distance où ils sont du centre de la Terre.

Nous donnerons dans la suite d'autres applications de cette loi.

A D D I T I O N.

N O T R E loi du repos n'est point astreinte à des forces qui tirent suivant une même puissance de la distance, ni même suivant aucune puissance. Il suffit que ces forces soient proportionnelles à quelques fonctions des distances : & au lieu de les exprimer par $fz, f'z', f''z''$, on les

peut exprimer par $fZ, f'Z', f''Z''$; Z, Z', Z'' , marquant les fonctions quelconques des distances z, z', z'' , auxquelles elles répondent : la même démonstration subsiste. Pour que le système soit en équilibre, on a

$$mfZ dz + m'f'Z'dz' + m''f''Z''dz'' + \&c. = 0.$$

D'où l'on voit que la quantité

$$mf\int Z dz + m'f'\int Z'dz' + m''f''\int Z''dz'' + \&c.$$

étoit un *minimum*.

La loi du repos se peut donc énoncer ainsi :

Soit un système de corps qui pesent ou qui soient attirés vers des centres par des forces qui agissent chacune sur chacun comme des fonctions quelconques de leurs distances aux centres : pour que tous ces corps demeurent en repos, il faut que la somme des produits de chaque masse par l'intensité de sa force, & par l'intégrale de chaque fonction multipliée par l'élément de la distance au centre (qu'on peut appeller la somme des forces du repos) fasse un minimum.

F I N.

ASTRONOMIE

ASTRONOMIE NAUTIQUE, OU

ÉLÉMENTS D'ASTRONOMIE ,

*Tant pour un observatoire fixe , que pour
un observatoire mobile.*

*Præps , aërii speculâ de montis , in undas
Deferar.*

Virgil. Eclog. VIII.

IMPRIMÉ AU LOUVRE
EN M. DCC. XLIII. ET EN M. DCC. LI.

the first of these is the fact that the
the second is the fact that the
the third is the fact that the
the fourth is the fact that the
the fifth is the fact that the
the sixth is the fact that the
the seventh is the fact that the
the eighth is the fact that the
the ninth is the fact that the
the tenth is the fact that the
the eleventh is the fact that the
the twelfth is the fact that the
the thirteenth is the fact that the
the fourteenth is the fact that the
the fifteenth is the fact that the
the sixteenth is the fact that the
the seventeenth is the fact that the
the eighteenth is the fact that the
the nineteenth is the fact that the
the twentieth is the fact that the
the twenty-first is the fact that the
the twenty-second is the fact that the
the twenty-third is the fact that the
the twenty-fourth is the fact that the
the twenty-fifth is the fact that the
the twenty-sixth is the fact that the
the twenty-seventh is the fact that the
the twenty-eighth is the fact that the
the twenty-ninth is the fact that the
the thirtieth is the fact that the
the thirty-first is the fact that the
the thirty-second is the fact that the
the thirty-third is the fact that the
the thirty-fourth is the fact that the
the thirty-fifth is the fact that the
the thirty-sixth is the fact that the
the thirty-seventh is the fact that the
the thirty-eighth is the fact that the
the thirty-ninth is the fact that the
the fortieth is the fact that the
the forty-first is the fact that the
the forty-second is the fact that the
the forty-third is the fact that the
the forty-fourth is the fact that the
the forty-fifth is the fact that the
the forty-sixth is the fact that the
the forty-seventh is the fact that the
the forty-eighth is the fact that the
the forty-ninth is the fact that the
the fiftieth is the fact that the
the fifty-first is the fact that the
the fifty-second is the fact that the
the fifty-third is the fact that the
the fifty-fourth is the fact that the
the fifty-fifth is the fact that the
the fifty-sixth is the fact that the
the fifty-seventh is the fact that the
the fifty-eighth is the fact that the
the fifty-ninth is the fact that the
the sixtieth is the fact that the
the sixty-first is the fact that the
the sixty-second is the fact that the
the sixty-third is the fact that the
the sixty-fourth is the fact that the
the sixty-fifth is the fact that the
the sixty-sixth is the fact that the
the sixty-seventh is the fact that the
the sixty-eighth is the fact that the
the sixty-ninth is the fact that the
the seventieth is the fact that the
the seventy-first is the fact that the
the seventy-second is the fact that the
the seventy-third is the fact that the
the seventy-fourth is the fact that the
the seventy-fifth is the fact that the
the seventy-sixth is the fact that the
the seventy-seventh is the fact that the
the seventy-eighth is the fact that the
the seventy-ninth is the fact that the
the eightieth is the fact that the
the eighty-first is the fact that the
the eighty-second is the fact that the
the eighty-third is the fact that the
the eighty-fourth is the fact that the
the eighty-fifth is the fact that the
the eighty-sixth is the fact that the
the eighty-seventh is the fact that the
the eighty-eighth is the fact that the
the eighty-ninth is the fact that the
the ninetieth is the fact that the
the ninety-first is the fact that the
the ninety-second is the fact that the
the ninety-third is the fact that the
the ninety-fourth is the fact that the
the ninety-fifth is the fact that the
the ninety-sixth is the fact that the
the ninety-seventh is the fact that the
the ninety-eighth is the fact that the
the ninety-ninth is the fact that the
the hundredth is the fact that the

AVERTISSEMENT

MIS À LA SECONDE ÉDITION.

CETTE nouvelle édition est différente de la première, quoiqu'elle ne contienne guere que les mêmes choses, & que l'ordre même n'en soit pas fort différent. J'avois bien déduit toute cette Astronomie de cinq seules formules, qui en effet donnent la solution de tous les problèmes possibles : cependant quelquefois je ne m'étois pas assez étendu sur toutes les circonstances d'une question, & quelquefois il m'étoit arrivé de traiter comme des questions différentes ce que je pouvois réduire à une même, en lui donnant un autre énoncé. Dans cette édition j'ai diminué le nombre des problèmes, quoique j'aie rendu l'ouvrage

plus complet ; & je crois en tout lui avoir donné une meilleure forme.

On trouvera encore une autre différence entre les deux éditions. Dans la première , toutes les solutions de problèmes n'étoient qu'en exemples , qui ne pouvoient avoir toute la généralité possible ; dans celle-ci , toutes les solutions sont en préceptes généraux : & comme l'usage de ces préceptes pouvoit rester difficile , j'en ai toujours fait ensuite l'application à des exemples.

Enfin j'ai retranché entièrement quelques problèmes , comme trop faciles à déduire de ce que j'ai donné , ou comme inutiles , ou comme trop étrangers à ma matière.

ASTRONOMIE NAUTIQUE.

✱✱✱ *O*ur l'art du Navigateur con-
✱✱✱ **T**riste à pouvoir connoître à cha-
✱✱✱ que instant le point de la sur-
face de la mer où il est ; & l'on peut
réduire sous deux genres tous les
moyens qu'il a pour cela : on peut
appeller moyens géographiques ceux
qui consistent dans la direction & la
longueur de la route : les autres , que
j'appellerai moyens astronomiques ,
comprennent tous ceux qu'on peut
tirer de l'observation des astres.

Malgré cette division , on ne doit
pas regarder ces différents moyens
comme absolument indépendants les uns
des autres. Ceux que l'Astronomie four-
nit dépendent à la vérité fort peu des
moyens géographiques : mais ces der-
niers ne sauroient atteindre à leur per-
fection sans le secours de l'Astrono-
mie. La direction de la route indi-

quée par la boussole n'est pas toujours la véritable direction : cette aiguille admirable qui montre le nord au Navigateur , ne le lui montre pas constamment ni exactement : l'observation des astres le fait appercevoir de ses variations , & le met à portée d'y remédier. Dès qu'il a perdu de vue les terres , qu'il ne voit plus que le ciel & la mer , les astres sont les seuls flambeaux qui puissent le conduire en sûreté.

Si l'on fait l'énumération de tous les moyens qu'on a , ou qu'il semble qu'on ait pour trouver le point du globe où l'on est , & qu'on considère le problème spéculativement ; on croira qu'il y a plus de choses données qu'il n'est nécessaire pour le résoudre , & qu'il est un de ces problèmes que les Géomètres appellent plus que déterminés ; mais si l'on considère que la plupart de ces moyens ne sont donnés qu'assez imparfaitement , & que chacun a besoin d'être corrigé ou confirmé par les autres , on verra que tous réunis ensemble , suffisent à peine.

On ne sauroit donc trop s'appliquer à perfectionner chacun des moyens. Ce seroit un grand avantage si les uns n'étoient jamais nécessaires que lorsque les circonstances empêcheroient de se servir des autres ; ou si au lieu des corrections que ces différents moyens se procurent , ils ne seroient jamais qu'à se confirmer.

Dans mes *Elements de Géographie*, & dans les *Mémoires de l'Académie* *, j'ai exposé les moyens géographiques ; ceux qui dépendent de la grandeur des degrés de la Terre , de la direction de la route , & de la longueur des arcs que le vaisseau trace sur la surface de la mer.

Les moyens astronomiques se réduisent à deux principaux : l'un est la latitude , l'autre , la longitude.

J'ai expliqué dans le *Discours sur la parallaxe de la Lune* , l'usage qu'on peut faire de cet astre pour connoître la longitude sur mer ; & comme cette méthode m'a paru celle qui jusqu'ici

* *Mémoires de l'Acad.* année 1744.

est le plus à notre portée , je me suis attaché à la perfectionner.

Je viens maintenant à la latitude ; à ce point principal de l'art du Pilote , qui lui fait connoître à quelle distance il est de l'équateur.

Lorsque j'ai commencé cette partie de la Navigation , je n'ai pas prévu toute l'étendue qu'elle devoit avoir. En effet , si je ne destinois ce que j'ai à dire sur la latitude que pour l'usage ordinaire des gens de mer , l'ouvrage ne seroit pas long. La hauteur méridienne du Soleil , ou de quelqu'Etoile , dont la déclinaison soit connue , leur suffit pour déterminer cette latitude : & ils sont si bornés à cette méthode , que si quelque nuage les empêche de voir le Soleil ou l'Etoile au moment de leur passage par le méridien , ils ne connoissent guere d'autre moyen astronomique pour y suppléer.

Mais quand j'ai voulu parcourir toutes les ressources que le Navigateur peut tirer de l'observation des astres , j'ai trouvé tant de choses utiles ou curieuses , que j'ai vu que l'ouvrage

méritoit beaucoup plus d'étendue que
 je n'avois pensé : j'ai vu que quoique
 l'Astronomie ordinaire des gens de
 mer fût fort bornée , une science beau-
 coup plus vaste leur seroit utile ; que
 quoique leurs observations fussent assez
 simples , on pouvoit leur en enseigner
 de plus simples encore : enfin j'ai trou-
 vé des méthodes qui ne supposent ni
 adresse , ni même presque d'instru-
 ments.

La recherche de tous les moyens
 par lesquels on peut trouver la latitu-
 de , m'a jeté dans une théorie assez
 étendue , & m'a conduit à un ouvrage
 qu'on peut appeller des éléments d'A-
 stronomie , tant pour un observatoire
 fixe , que pour un observatoire mobile.

En effet , on peut considérer le Na-
 vigateur comme un Astronome , qui
 ne diffère de l'Astronome ordinaire ,
 qu'en ce que celui-ci fait ses observa-
 tions dans un lieu fixe , & que
 celui-là fait les siennes dans un obser-
 vatoire entraîné par les vents , & con-
 tinuellement agité. Et si la précision
 qu'on exige de celui qui se trouve

dans toutes les circonstances favorables , rend son art difficile ; on peut dire que le défaut de ces circonstances rend l'art de l'autre plus difficile encore , & l'oblige d'avoir recours à des méthodes plus subtiles.

Il est vrai qu'on n'exige pas de l'Astronome Navigateur le même degré de précision qu'on exige de l'Astronome sédentaire. Celui-ci appliqué à perfectionner l'Astronomie , ne doit négliger aucun des moyens qui peuvent donner ou augmenter la précision , quelque pénibles qu'ils puissent être : celui-là , content de bien diriger sa roue , doit souvent faire céder une précision scrupuleuse à la facilité & à la commodité de ses opérations. Une quantité de quelques secondes est importante pour l'Astronome ; le Rélote peut impunément négliger quelques minutes : c'est au Géomètre à calculer les cas où cette précision est nécessaire , & ceux où l'on peut s'en passer de cette licence. Enfin quelquefois le Navigateur seroit heureux de connoître sa latitude d'une manière encore moins exacte.

J'ai eu tous ces cas en vue dans les problèmes qui composent l'ouvrage suivant.

Dans les uns, je suppose l'Astronome dans l'observatoire le plus stable, le plus commode, & le mieux muni d'instruments : & je lui propose des moyens pour perfectionner l'Astronomie.

D'autres problèmes sont destinés pour un Astronome dont l'observatoire seroit bien pourvu d'instruments, mais continuellement agité : & je lui propose les moyens que cette agitation rend nécessaires, & laissent possibles.

Enfin on trouvera des problèmes dans lesquels je ne suppose plus un Astronome, mais un Navigateur sans science, sans industrie, & même d'instruments, tel qu'il peut se trouver après un naufrage : & je lui offre les dernières ressources qu'un état aussi malheureux lui permet.

Ces différentes sortes de problèmes sembloient exiger qu'on les distinguât, & qu'on en formât différentes parties de l'ouvrage : mais si les usages diffé-

rents auxquels ils sont destinés , exigeoient un tel ordre , la nature de la chose ne l'a point permis ; & j'ai cru devoir suivre la connexion que ces problèmes avoient les uns avec les autres , plutôt que de les assujettir aux circonstances où se peut trouver celui qui s'en sert.

On ne doit donc pas s'attendre à trouver ici un ouvrage qui soit à la portée de tous les Pilotes. J'ai voulu présenter l'art dans toute son étendue : proposer ce que les Astronomes pourroient entreprendre dans des observatoires stables & commodes : ce que pourroient exécuter d'habiles Pilotes sur leurs vaisseaux : enfin ce qui resteroit à faire pour les Navigateurs les plus bornés , & dans les occasions les plus fâcheuses.

Cet ouvrage est , comme on voit , fort différent de tous les traités d'Astronomie qui ont paru jusqu'ici ; plus différent encore de tous les traités de Navigation. Dans les uns on ne s'est attaché qu'aux méthodes qui supposent des observatoires fixes ; & il s'en faut

bien qu'on les ait toutes épuisées : dans les autres on s'est contenté de donner quelques problèmes astronomiques des plus simples. Et l'on a réduit ainsi l'Astronomie ordinaire à ne pouvoir guere être utile au Navigateur ; ou l'Astronomie du Navigateur à n'être qu'une petite partie de l'autre Astronomie.

On trouvera au contraire dans notre Astronomie nautique une science supérieure à l'Astronomie ordinaire. En effet , l'Astronomie qui s'exerce dans un observatoire continuellement agité , & dont le lieu sur le globe de la Terre change continuellement , est beaucoup plus difficile , & a besoin d'une plus grande industrie que celle qui jouit du repos.

Je ne puis mieux faire sentir la différence de ces deux Astronomies , que par la considération de quelques-uns des problèmes qu'on trouvera dans l'ouvrage suivant.

De toutes les observations qu'on peut faire sur mer , la plus facile & la plus exacte , c'est celle du lever &

du coucher du Soleil. On n'a besoin d'aucun instrument. Tout le monde fait que lorsque cet astre est dans l'horizon, l'épaisseur de l'atmosphère interceptant une grande partie de ses rayons, nous permet de voir son disque sans avoir besoin d'armer l'œil d'aucun verre coloré, & sans crainte d'en être ébloui. La ligne qui termine l'horizon sensible, est si éloignée de l'observateur par rapport aux petites différences que l'agitation des flots cause à la hauteur où il se trouve, qu'il peut prendre les moments où il observe l'émergence & l'immersion du Soleil dans l'horizon, pour les mêmes qu'ils seroient si le vaisseau restoit immobile.

Mais cette observation si simple & si sûre, si l'on en veut faire l'usage qui se présente d'abord à l'esprit pour trouver la latitude, suppose qu'on sache l'heure à laquelle elle se fait : & l'on ne peut avoir l'heure sur la mer, que par des observations qui n'ont ni la même simplicité, ni la même exactitude.

J'ai donc cherché une méthode pour

trouver la latitude par les observations du lever & du coucher du Soleil , qui fût indépendante de l'heure vraie ; & dans laquelle on n'auroit à considérer que l'intervalle de temps écoulé entre ces observations : intervalle qu'on peut connoître par une simple montre , qui n'a pas besoin d'être réglée sur le Soleil , pourvu seulement que son mouvement soit assez uniforme pendant 24 heures.

J'ai pensé que réduisant le problème à des observations qu'on peut faire dans un vaisseau avec autant de précision que dans un observatoire inébranlable , j'aurois une méthode qui donneroit la latitude sur mer aussi exactement qu'elle la pourroit donner sur terre.

Mais je ne puis dissimuler qu'en réduisant le problème à une si grande simplicité pour l'observateur , il devient difficile pour le Géometre qui le veut résoudre. Il semble qu'il y ait dans la science que nous traitons une fatale compensation entre la simplicité des opérations , & la difficulté des calculs.

Pour faire connoître cette difficulté, il faut donner une idée du problème dans toute son étendue.

On sait que pour tous les peuples de la Terre, chaque jour de l'année a sa durée particulière : d'autant plus longue pour chacun pendant son été, & d'autant plus courte pendant son hiver, qu'il habite une région plus éloignée de l'équateur. Il y a donc pour chaque lieu un jour qui est le plus long de tous les jours de l'année, & un jour qui est le plus court. Le plus long jour est d'autant plus long, & le plus court est d'autant plus court, que le lieu est plus près du pôle : dès qu'on atteint le cercle polaire, le plus long jour ne finit plus ; le Soleil au solstice d'été ne se couche plus pour les habitants des zones glacées ; il ne se leve plus pour eux lorsqu'il est au solstice d'hiver.

On peut donc par la durée du plus long jour, connoître la distance où l'on est du pôle, qui est le complément de la latitude.

C'est ainsi que les anciens Géographes

phes avoient déterminé les latitudes de plusieurs villes des trois parties du monde connues de leur temps. Et Ptolémée , qui nous a laissé ces latitudes , préféroit cette méthode à toutes les autres.

Plusieurs causes cependant rendoient ces déterminations peu exactes. Les anciens ne connoissoient ni la réfraction , ni la parallaxe du Soleil , ni assez exactement l'obliquité de l'écliptique ; & ils n'avoient point de mesure du temps assez précise.

Ce sont là les causes des erreurs qu'on trouve dans les latitudes déterminées par les anciens. Les connoissances qu'on a aujourd'hui nous mettent à portée de les corriger : mais le problème , tel qu'ils se le sont proposé , demeure sujet à une grande limitation. C'est que dépendant de l'observation de la durée du plus long ou du plus court jour , il n'y a que deux jours dans l'année où l'on puisse le résoudre.

Voici pourquoi jusqu'ici l'on s'est astreint à cette condition.

La durée du jour dépend de deux

causes : 1°. du lieu que l'observateur occupe sur le globe de la Terre : 2°. du lieu du Soleil dans l'écliptique. Dans chaque lieu de la Terre, plus le Soleil s'approche du tropique voisin, plus le temps de son séjour sur l'horizon est long ; plus il s'éloigne du tropique, plus ce temps est court.

Mais le changement continuél de déclinaison du Soleil, qui, pendant le cours de l'année, rend dans chaque lieu les jours inégaux, altere la durée même de chaque jour, rend inégaux son soir & son matin : rend chaque jour plus long ou plus court qu'il ne seroit si le Soleil à son coucher avoit conservé la même déclinaison qu'il avoit à son lever.

Dans deux points seuls de l'écliptique, la déclinaison du Soleil demeure assez constamment la même pour ne causer à la durée du jour aucune altération sensible : ces points sont ceux où le Soleil, après s'être éloigné de l'équateur, cesse de s'en éloigner, & s'en rapproche. Et ces points, qui sont les points solsticiaux, répondent au plus long & au plus court jour de l'année.

Voilà pourquoi jusqu'ici l'on s'est fixé à ces jours, pour trouver la latitude par leur durée. Mais on voit par là combien cette restriction rend le problème peu utile pour le Navigateur, qui chaque jour a besoin de connaître sa latitude.

D'autres causes encore semblent lui refuser l'usage de ce problème. Nous avons vu que l'agitation des flots ne changeoit point l'instant du lever & du coucher du Soleil : mais il n'en est pas ainsi du transport du vaisseau d'un lieu à l'autre. Selon la plage vers laquelle il navigue, il va trouver un jour plus long ou plus court que celui que le lieu du matin lui promettoit : & quoique les moments de l'émergence & de l'immersion du Soleil dans l'horizon soient les mêmes qu'ils seroient si l'observateur n'éprouvoit aucune agitation, ils ne sont pas séparés par le même intervalle qu'ils le seroient si l'observateur étoit demeuré au même lieu. Pour m'expliquer plus brièvement, l'agitation n'apporte aucun trouble à l'observation du lever ni du coucher

du Soleil , mais le mouvement progressif du vaisseau éloigne ou rapproche ces deux instants , & change pour le Navigateur la durée qui les sépare.

J'ai voulu vaincre toutes ces difficultés , & rendre praticable sur la mer , & tous les jours de l'année , une méthode qui a sur toutes les autres de si grands avantages , par le genre d'observations qu'elle demande.

Mais le problème simple & facile lorsqu'on le résout , comme les anciens l'ont résolu , dans un observatoire fixe , sans avoir égard à la réfraction , ni à la parallaxe , & qu'on l'astreint au jour du solstice , devient difficile lorsqu'on veut le résoudre pour tous les jours de l'année , & dans toutes les circonstances où le Navigateur se trouve.

Car 1°. la réfraction faisant paroître le Soleil avant qu'il se leve , & le faisant paroître encore après qu'il est couché , rend le jour plus long qu'il n'est réellement.

2°. En tout autre temps qu'aux solstices , le changement continuel de déclinaison du Soleil altère la durée du

jour , & l'allonge ou la raccourcit selon que le Soleil s'approche ou s'éloigne du tropique.

3°. L'observatoire se mouvant lui-même , fait voir au Navigateur un jour plus long ou plus court , selon le lieu où il dirige sa route.

Je ne parle point de l'effet de la parallaxe du Soleil , parce qu'il est trop peu considérable pour qu'on y doive faire attention dans les problèmes nautiques. Si cependant on y vouloit avoir égard , on sait que l'effet de cette parallaxe étant de faire voir le Soleil plus bas qu'il n'est par rapport au centre de la Terre , pendant que la réfraction le fait voir plus haut ; il n'y a qu'à retrancher la parallaxe de la réfraction , & prendre le reste pour la quantité dont le Soleil paroît plus élevé qu'il n'est.

Pour résoudre le problème dans toutes ses circonstances , il faut donc apprécier ce que chacune contribue à rendre le jour plus long ou plus court , & chercher quelle seroit sa durée pour un observateur , qui depuis le lever du So-

leil jusqu'à son coucher seroit demeuré à la même place ; qui seroit sur une Terre qui n'auroit point d'athmosphère , ou dont l'athmosphère ne causeroit aux rayons de lumière aucune refraction ; enfin qui observeroit un Soleil qui depuis son lever jusqu'à son coucher conserveroit toujours la même déclinaison.

Le calcul est compliqué : mais la peine ne sera que pour le Géometre. Il pourra donner au Pilote des tables par le moyen desquelles il aura sa latitude ; en observant seulement la durée apparente du jour , & à peu près la route qu'il aura tenue du matin au soir.

Il n'y a plus à ce problème qu'une restriction ; mais une restriction qui est attachée à la nature de la chose , & qui ne peut guere nuire dans l'usage qu'on en veut faire. Deux seuls jours de l'année la méthode des anciens étoit praticable : il n'y a que deux jours dans l'année où l'on ne puisse pas pratiquer la nôtre ; qui sont les jours de l'équinoxe. Lorsque le Soleil est à ces points , les jours étant égaux dans tous les lieux de la Terre , il est évident qu'on

ne sauroit déterminer la latitude d'aucun lieu par leur durée. Hors de ces temps, notre méthode est universelle.

Je parlerai maintenant d'un autre problème, qui ne donne qu'une exactitude fort bornée, mais qui mérite d'être connue par sa singularité, & par la simplicité de l'observation qu'elle exige. Elle feroit trouver la latitude par le seul temps que le Soleil ou la Lune emploient à s'élever de tout leur disque au dessus de l'horizon, ou à se plonger au dessous.

Ce temps en général dépendant de la grandeur du diamètre de l'astre, de sa déclinaison, & de la hauteur du pôle dans le lieu de l'observation; pour un jour de l'année donné, ne dépend donc plus que de la hauteur du pôle. Plus l'axe de la Terre est élevé, plus l'équateur & ses cercles parallèles sont coupés obliquement par l'horizon, plus le temps de l'émerfion & de l'immersion du disque est long; & sa durée détermine la hauteur du pôle.

Quelque facile que soit cette méthode, que le Navigateur ne soit pas tenté

de s'y arrêter lorsqu'il en pourra pratiquer d'autres plus exactes. Je ne la lui offre que pour des cas malheureux où il n'auroit point d'autre ressource.

Après l'observation du lever & du coucher des astres, il n'y en a pas de plus simple ni de plus facile, que celle du moment où ils se trouvent dans un même vertical. Dans un observatoire stable, une lunette fixée à angles droits sur un axe horizontal, & mobile autour de cet axe, donne ces observations avec une grande précision; sur la mer un fil chargé d'un plomb suffit : & si l'on se vouloit contenter d'une moindre exactitude, on pourroit à la vue simple juger assez juste si la ligne qui joint deux Etoiles est verticale, sur-tout si l'on choisissoit deux Etoiles assez éloignées l'une de l'autre.

Je donne pour trouver la latitude par des observations de cette espece, une méthode qui peut être fort utile sur terre & sur mer.

J'ai déjà dit que l'ouvrage suivant n'étoit pas destiné uniquement pour les gens de mer : on y trouvera plusieurs problèmes pour la perfection de l'Astronomie.

Tout le monde sait , du moins tous les Astronomes savent que lorsqu'on veut déterminer la hauteur du pôle , on suppose connue la déclinaison de l'astre qu'on emploie à cette recherche ; & que lorsqu'on veut déterminer la déclinaison d'un astre , on suppose connue la hauteur du pôle. La plupart des méthodes pour trouver l'une ou l'autre de ces deux choses , sont dans le cas de ce cercle vicieux. On trouvera dans l'ouvrage suivant un problème par lequel on l'évite : on aura la hauteur du pôle indépendamment de la déclinaison des astres ; la déclinaison des astres indépendamment de la hauteur du pôle : & le tout se fera sans la mesure actuelle d'aucun angle.

Depuis qu'on connoît la propriété qu'a l'athmosphère de rompre les rayons de la lumière , & de nous faire voir les astres dans des lieux où ils ne sont point , tous les Astronomes se sont appliqués à déterminer la hauteur du pôle par des méthodes qui évitassent l'effet de cette illusion ; quoiqu'il paroisse que jusqu'ici ce n'ait pas été

avec grand succès. Les unes de ces méthodes supposent qu'on connoisse la déclinaison des Etoiles qu'on emploie à cette recherche : & c'est cette déclinaison qu'il est difficile de trouver exempte des erreurs de la réfraction. D'autres supposent l'observation d'une Etoile au zénith : ce qui les limite extrêmement. On trouvera dans ce livre un problème où toutes ces suppositions sont évitées ; & qui met la hauteur du pôle , & la déclinaison des Etoiles , à l'abri des effets de cette réfraction.

Je dois maintenant parler de la méthode que j'ai suivie dans tout cet ouvrage.

Pour résoudre les problèmes astronomiques , on a d'ordinaire recouru à une science secondaire : on les réduit à des triangles tracés sur la surface de la sphère , que cette science apprend à résoudre. Je parle de la Trigonométrie sphérique : elle offre d'abord de grandes facilités. On trouve ses règles à la tête de plusieurs livres ; & souvent on résout des questions im-

portantes de l'Astronomie par une application aveugle de ces regles. Par elles on est dispensé de pénétrer dans la nature de la question ; & par elles l'Astronome se croiroit dispensé d'être Géometre , s'il pouvoit méconnoître la science à laquelle elles doivent leur origine.

J'admire l'art des premiers Géometres qui nous ont donné la Trigonométrie sphérique : mais je crois que les esprits géométriques préféreront , pour les problèmes d'Astronomie , des solutions immédiates à celles qu'on emprunte d'une autre science , & auxquelles on ne parvient qu'en pratiquant des regles dont l'origine n'est guere présente à l'esprit , & dont l'application est souvent ambiguë.

J'ai voulu délivrer l'Astronomie du besoin de cette science secondaire ; & la faire dépendre immédiatement de l'analyse dont toutes les Sciences mathématiques dépendent.

Je dois avouer qu'on trouvera dans la méthode que j'ai suivie , l'inconvénient qui se rencontre dans toutes les


92 ASTRONOMIE NAUTIQUE.

méthodes générales : c'est de donner pour quelques cas particuliers des solutions moins simples & moins commodes que celles auxquelles on parviendroit par des routes indirectes. Mais je ne crois pas qu'on insiste sur ce reproche, lorsqu'on fera attention à l'avantage d'avoir tous les problèmes qui composent l'ouvrage suivant, résolus par une même méthode & par un même calcul.

Après le grand nombre de choses que j'ai annoncées, je crains de dire que tout est contenu dans quelques lignes d'algebre. Ai-je le tort d'avoir présenté l'ouvrage d'une manière trop avantageuse ? ou l'algebre a-t-elle le mérite d'avoir en effet réduit dans un si petit volume une science très-vaste ? C'est à ceux qui examineront l'ouvrage à en juger.

ASTRONOMIE

NAUTIQUE.





PRÉPARATION

POUR TOUT LE LIVRE,

O U

*Dénomination des principaux éléments
de la sphere.*

❖❖❖ O I E N T Pp l'axe de la sphere
❖❖❖ céleste : $PZAHp\gamma ahP$ le mé-
❖❖❖ ridien, & HXh l'horizon du
lieu ; AXa l'équateur , DEd le cercle
que décrit l'astre , PEp le méridien
qui passe au point E où l'astre se trou-
ve , ZEz son vertical , & LEl son
almicantarath.

Toutes les lignes suivantes sont dans
l'hémisphere élevé sur le plan du pa-
pier , & dont la commune section
avec ce plan , est le méridien $PZAH$
 $p\gamma ahP$.

Soit le rayon . . . $CP = r$ On aura :

$$CO = \frac{r x}{s}$$

Le sinus de la déclinaif.

de l'astre $CB = x$

$$BO = \frac{cx}{s}$$

Son co-sinus $BD = y$

$$GF = \frac{ky}{r}$$

Le sinus de la hauteur

du pôle $PQ = s$

$$EF = \frac{km}{r}$$

Son co-sinus $CQ = c$

$$BF = \frac{ay}{r}$$

Le sinus de la hauteur

de l'astre $CG = h$

$$EF = \frac{zy}{s}$$

Son co-sinus $GE = k$

Le sinus de l'angle

horaire DPE $= t$


Son co-sinus $= u$

Le sinus de l'angle

azymuthal LGE $= m$

Son co-sinus $= n$

PROBLEME



PROBLÈME I.

Trouver la relation entre la hauteur du pôle, la déclinaison d'un astre, sa hauteur, & son angle horaire.


$GO = CG - CO = \frac{hs - rx}{s}$; & les triangles semblables QCP , GOF , donnant

$$c : r :: \frac{bs - rx}{s} : FO = \frac{rbs - rrx}{cs}.$$

On a (à cause de $BO + OF = BF$)

$$\frac{dcx + rbs - rrx}{cs} = \frac{rx}{r} : \text{ou}$$

$$rth - rsx = cyu.$$



G ij

PROBLÈME II.

Trouver la relation entre la hauteur du pôle, la déclinaison d'un astre, sa hauteur, & son angle azymuthal.


Les triangles semblables PQC, FGO , donnent

$$s : c :: \frac{kn}{r} : GO = \frac{ckn}{rs}.$$

Donc (à cause de $CO + OG = CG$)

$$\frac{rrx + ckn}{rs} = h, \text{ ou}$$

$$rrx + ckn = hrs.$$



PROBLÈME III.

Trouver la relation entre la hauteur du pôle , la déclinaison d'un astre , son angle horaire , & son angle azymuthal.

On a $m : n :: \frac{ty}{r} : FG = \frac{nty}{rm}$.


Les triangles semblables QPC, GFO , donnent

$$s : r :: \frac{nty}{rm} : FO = \frac{nty}{ms}$$

Donc (à cause de $FO + OB = FB$)

$$\frac{nty + cmx}{ms} = \frac{uy}{r}, \text{ ou }$$

$$rnty + rcmx = msuy.$$



PROBLÈME IV.

Trouver la relation entre la hauteur du pôle, la hauteur d'un astre, son angle horaire, & son angle azymuthal.

Les triangles semblables QPC, GFO , donnent

$$s : r :: \frac{kn}{r} : FO = \frac{kn}{r},$$

$$s : c :: \frac{kn}{r} : GO = \frac{ckn}{rs},$$

$$\& CO = \frac{rbs - ckn}{rs}.$$


Les triangles semblables PCQ, COB , donnent

$$r : c :: \frac{rbs - ckn}{rs} : OB = \frac{rbs - cckn}{rs}.$$

$$\text{Or } FO + OB : EF, \text{ ou}$$

$$\frac{rkn + rbs - cckn}{rs} : \frac{km}{r} :: u : t. \text{ Donc}$$

$$rcht + knst = rkm u.$$



PROBLÈME V.

Trouver la relation entre la déclinaison d'un astre , sa hauteur , son angle horaire , & son angle azymuthal.

La commune section de l'almicantarath , & du cercle que décrit l'astre , donne

$$\frac{km}{r} = \frac{ty}{r} ; \text{ ou }$$

$$km = ty.$$

SCHOLIE.

Ces cinq formules donnent toutes les relations possibles entre les cinq éléments qui entrent dans ces problèmes. Mais dans l'hémisphère que nous avons considéré, la position de quelques-unes de ces lignes peut varier; & ces lignes alors changent de signe. Les trois qui sont sujettes à changer de position, sont n , u & x .

La déclinaison étant vers le pôle élevé.

I.

L'astre étant vers le méridien supérieur; l'azymuth tombant vers le pôle abaissé; n , u & x conservent leur position.

Les formules sont

$$r r h - r s x = c u y.$$

$$r r x + c k n = r h s.$$

$$r n t y + r c m x = m s u y.$$

$$r c h t + k n s t = r k m u.$$

$$k m = t y.$$

I I.

L'astre étant vers le méridien supérieur ; l'azymuth vers le pôle élevé ; n change de position.

Les formules sont

$$\begin{aligned} r r h - r s x &= c u y. \\ r r x - c k n &= r h s. \\ - r n t y + r c m x &= m s u y. \\ r c h t - k n s t &= r k m u. \\ k m &= t y. \end{aligned}$$

I I I.

L'astre étant vers le méridien inférieur ; l'azymuth vers le pôle élevé ; n & u changent de position.

Les formules sont

$$\begin{aligned} r r h - r s x &= - c u y. \\ r r x - c k n &= r h s. \\ - r n t y + r c m x &= - m s u y. \\ r c h t - k n s t &= - r k m u. \\ k m &= t y. \end{aligned}$$

La déclinaison étant vers le pôle abaissé.

IV.

L'astre étant toujours vers le méridien supérieur ; l'azymuth toujours vers le pôle abaissé ; x seul change de position.

Les formules sont

$$\begin{aligned} r r h + r s x &= c u y. \\ - r r x + c k n &= r h s. \\ r n t y - r c m x &= m s u y. \\ r c h t + k n s t &= r k m u. \\ k m &= t y. \end{aligned}$$

Tout ceci se passe dans l'hémisphère élevé sur le plan du papier terminé par le méridien $PZAHp$ & hP . Si dans quelques-uns des problèmes suivants, on emploie des lignes de l'autre hémisphère, quelques lettres qui sont invariables dans un seul hémisphère varieront ; comme m & t , qui étant positives dans l'un, seroient négatives dans l'autre.

Ces cinq formules contiennent les vingt problèmes suivants.

PAR LA 1^{re}. FORMULE :

$$r r h * r s x = * c u y.$$

Sans connoître l'angle azymuthal.

1.

Connoissant la déclinaison de l'astre , la hauteur & son angle horaire , on a la hauteur du pole.

2.

Connoissant la hauteur du pole, la hauteur de l'astre , & son angle horaire , on a sa déclinaison.

3.

Connoissant la hauteur du pole , la déclinaison de l'astre , & sa hauteur , on a son angle horaire.

4.

Connoissant la hauteur du pole , la déclinaison de l'astre , & son angle horaire , on a sa hauteur.

PAR LA 2^{de}. FORMULE :

$$* r r x * c k n = r h s.$$

Sans connoître l'angle horaire.

I.

Connoissant la déclinaison de l'astre , sa hauteur , & son angle azymuthal , on a la hauteur du pole.

Connoissant la hauteur du pole , la hauteur de l'astre , & son angle azymuthal , on a la déclinaison.

Connoissant la hauteur du pole , la déclinaison de l'astre , & sa hauteur , on a son angle azymuthal.

Connoissant la hauteur du pole , la déclinaison de l'astre , & son angle azymuthal , on a sa hauteur.

PAR LA 3^{me}. FORMULE :

$$r n t y * r c m x = * m s u y.$$

Sans connoître la hauteur de l'astre.

1.

Connoissant la déclinaison de l'astre, son angle horaire, & son angle azymuthal, on a la hauteur du pole.

2.

Connoissant la hauteur du pole, l'angle horaire de l'astre, & son angle azymuthal, on a sa déclinaison.

3.

Connoissant la hauteur du pole, la déclinaison de l'astre, & son angle azymuthal, on a son angle horaire.

4.

Connoissant la hauteur du pole, la déclinaison de l'astre, & son angle horaire, on a son angle azymuthal.

PAR

P A R LA 4^{me}. FORMULE :

$$r c h t * k n s t = * r k m u.$$

Sans connoître la déclinaison de l'astre.

1. Connoissant la hauteur du pôle, & son angle horaire, on a son angle azymuthal.

Connoissant la hauteur de l'astre, son angle horaire, & son angle azymuthal, on a la hauteur du pôle.

2. Connoissant la hauteur du pôle, & son angle horaire, on a son angle azymuthal.

Connoissant la hauteur du pôle, la hauteur de l'astre, & son angle azymuthal, on a son angle horaire.

3. Connoissant la hauteur du pôle, & son angle azymuthal, on a son angle horaire.

Connoissant la hauteur du pôle, la hauteur de l'astre, & son angle horaire, on a son angle azymuthal.

4. Connoissant la hauteur du pôle, & son angle azymuthal, on a son angle horaire.

Connoissant la hauteur du pôle, l'angle horaire de l'astre, & son angle azymuthal, on a la hauteur.

5. Connoissant la hauteur du pôle, & son angle horaire, on a son angle azymuthal.

114 ASTRONOMIE

PAR LA 5^{me} FORMULE :

$$k m = t y.$$

Sans connoître la hauteur du pôle.

Connoissant la hauteur de l'astre, son angle horaire, & son angle azymuthal, on a sa déclinaison.

Connoissant la déclinaison de l'astre, sa hauteur, & son angle azymuthal, on a son angle horaire.

Connoissant la déclinaison de l'astre, sa hauteur, & son angle horaire, on a son angle azymuthal.

Connoissant la déclinaison de l'astre, son angle horaire, & son angle azymuthal, on a sa hauteur.

A
P R O B L È M E VI.

T Rouver la relation entre la hauteur du pôle , la déclinaison d'un astre , & le temps qu'il emploie sur l'horizon.

Ceci n'est qu'une limitation des usages de notre 1^{re}. formule ; car y faisant $h = 0$, puisque l'arc qu'on cherche est terminé par l'horizon ; l'on a

$$r s x = c u y.$$

On calcule par là facilement les arcs que les Astronomes appellent *semi-diurnes*.

On pourroit par là déterminer la déclinaison des astres.

On pourroit aussi trouver la hauteur du pôle.

Moyen pour trouver la réfraction horizontale.

L'équation $u = \frac{r''x}{r''}$, donnant le moment où le centre du Soleil est dans l'horizon; si dans ce moment on observe sa hauteur apparente, cette hauteur donnera la quantité de la réfraction horizontale affectée de la parallaxe horizontale du Soleil : & l'effet de la réfraction étant d'élever l'image du Soleil pendant que l'effet de la parallaxe est de l'abaisser; si l'on retranche de la hauteur du centre du Soleil sa parallaxe, le reste sera la quantité de la réfraction. Mais la parallaxe du Soleil étant fort peu considérable par rapport à la réfraction horizontale, elle peut être négligée dans les problèmes, qui ne demandent pas la dernière exactitude.

PROBLÈME VII.

Trouver la relation entre la hauteur du pôle, la déclinaison d'un astre, & son angle azymuthal, au moment de son lever ou de son coucher.

Ceci n'est qu'une limitation de la 2^{de}. formule, qui dans le cas où l'astre est dans l'horizon & $h = 0$, donne

$$r.x = c.n.$$

On calcule par là facilement les amplitudes ortives ou occases, par où l'on trouve la déclinaison de l'aiguille aimantée.

On pourroit déterminer la déclinaison des astres qui se levent & se couchent.

Enfin l'on pourroit trouver la hauteur du pôle.

A
PROBLÈME VIII.

Trouver la relation entre la déclinaison d'un astre, l'angle qu'il traverse, & le temps qu'il emploie à le traverser.

Soit le sinus de la moitié de l'angle $\equiv p$ pour le rayon $\equiv r$; & supposant qu'on observe l'astre à distances égales du méridien, on aura

$r : m :: k : p$; & $k m \equiv r p$. Par la 5^{me}. formule on a $k m \equiv t y$;
Donc $r p \equiv t y$.

Or, à quelque distance du méridien qu'on observe un astre traverser un angle donné, le temps qu'il y emploie (en négligeant l'effet de la réfraction) est toujours le même : on aura donc toujours

$$r p \equiv t y.$$

Scholie. On peut par ce problème,
Déterminer la déclinaison d'un astre,

par l'angle qu'il traverse , & par le temps qu'il emploie à le traverser.

Déterminer le temps par l'angle traversé , & par la déclinaison de l'astre.

Déterminer l'angle par le temps employé à le traverser , & par la déclinaison de l'astre.



PROBLÈME IX.

*L*A hauteur du pôle , & la déclinaison d'un astre étant données ; trouver l'azymuth que l'astre touche dans sa révolution.

Tous les astres qui passent entre le zénith & le pôle ont deux moments , l'un avant , l'autre après leur passage par le méridien , où leur cours est perpendiculaire à l'horizon , & commun au cercle qu'ils décrivent , & au cercle azymuthal. Voici la maniere de trouver ces points :

L'angle azymuthal qui répond à chaque point du cercle que décrit l'astre , croît jusqu'à ce qu'il soit parvenu à cette partie commune aux deux cercles ; & décroît aussi-tôt après. L'angle azymuthal qui convient à cette partie du cours de l'astre , est donc alors le plus grand qu'il puisse être.

Dans ce cas , la 2^{de}. formule est

$$r r x - c k n = r h s ;$$

Dans laquelle prenant la valeur de $n = \frac{r r x - r h s}{c k}$, la différentiant en fai-

sant c , x & s constants , & faisant la différence $= 0$, l'on a pour la hauteur qui convient au point qu'on cherche , $h = \frac{r s}{x}$; & substituant cette valeur de h dans la formule, on trouve

$$n = \frac{r \sqrt{(x x - s s)}}{c}.$$

Moyen pour trouver la réfraction.

Scholie. On tire du problème précédent un moyen pour déterminer les réfractions que les astres éprouvent à différentes hauteurs. Car si dans la 5^{me}. formule $k m = t y$, on substitue les valeurs de k & de m qui conviennent au point où l'astre tombe , ou s'élève perpendiculairement

à l'horizon , l'on a l'instant où cela arrive : l'on a aussi la hauteur à laquelle il est dans cet instant. Comparant donc à cette hauteur la hauteur observée , leur différence est la réfraction.



PROBLÈME X.

LA hauteur du pôle , & la déclinaison d'un astre étant données , trouver la relation entre un petit changement dans sa hauteur , & le temps qu'il y emploie.

La 1^{re}. formule peut avoir ces trois formes ,

$$rrh - rsx = cuy,$$

$$rrh - rsx = -cuy,$$

$$rrh + rsx = cuy.$$

Et pendant que l'astre s'élève ou s'abaisse , comme il n'arrive de changement qu'à h & u , l'on a en différentiant

$$rrdh = cydu.$$

Pour réduire les différentielles dh & du , aux petits arcs du vertical & de l'équateur , on a $dh = \frac{h}{r} dV$; & $du = \frac{t}{r} dE$, qui , substitués dans l'équation précédente , donnent

$$rrh dV = cty dE.$$

Ou à cause que dans l'horizon $k = r$,

$$\& t = \frac{rr}{cy} \sqrt{(yy - ss)},$$

$$r dV = \sqrt{(yy - ss)} dE.$$

Scholie. Ce problème est utile pour corriger les hauteurs des astres, lorsqu'on n'a pas pu faire les observations dans l'instant où elles devoient être faites.

On peut aussi par ce problème, trouver la durée du lever ou du coucher du Soleil; c'est-à-dire, trouver le temps que le Soleil emploie à s'élever ou à s'abaisser à l'horizon de tout son disque.

Car si l'on considère le diamètre du Soleil comme une assez petite quantité par rapport aux lignes qui entrent dans ce calcul, on pourra le prendre pour dV ; & l'on aura la durée du lever ou du coucher du Soleil par l'équation

$$dE = \frac{r}{\sqrt{(yy - ss)}} dV.$$

D'où l'on voit que lorsque la hauteur du pôle surpasse la codéclinaison du Soleil,

la durée du lever ou du coucher de cet astre est imaginaire : en effet le Soleil alors est toujours sur l'horizon.

Si le diamètre du Soleil est une quantité trop considérable par rapport aux autres lignes qui entrent dans ce calcul, & que cette expression de la durée du lever ou du coucher du Soleil ne soit pas assez exacte pour les usages auxquels on la destine ; l'on en trouvera une à laquelle il ne manque rien, dans le problème XII.

Trouver la hauteur du pôle par la durée du lever ou du coucher du Soleil.

Le calcul précédent donne

$$s = \sqrt{\left(\frac{y}{r} \right)^2 - \left(\frac{r}{R} \right)^2} \cdot \frac{R}{E}$$

Il est évident que la réfraction, quelque grande qu'elle soit, n'apporte ici aucune erreur. Il suffit seulement qu'elle demeure la même pendant l'observation ; ce qu'on peut bien prendre pour vrai, vu le peu de temps qu'elle dure ; car la réfraction ne fait ici que transporter l'horizon un peu plus haut qu'il n'est, ou le

changer dans un almicantarath fort peu élevé : & le temps que le Soleil emploie à s'élever au dessus de cet almicantarath , ou à s'abaisser au dessous , ne differe pas sensiblement du temps qu'il emploie à s'élever de la même quantité au dessus du véritable horizon , ou à s'abaisser au dessous.

On pourroit ainsi par l'observation la plus simple, connoissant la grandeur apparente du diamètre du Soleil , & la déclinaison de cet astre , trouver sur mer à peu près la hauteur du pôle. Quoique je ne donne pas ceci comme une méthode à employer lorsqu'on peut en pratiquer de plus exactes, il arrive dans la navigation des accidents si étranges, qu'on pourroit être heureux d'y avoir recours. Et il est toujours utile au Navigateur de connoître toutes les ressources de son art , chacune avec le degré de sûreté qu'elle comporte , afin qu'il puisse s'en servir dans le besoin.

PROBLÈME XI.

Trouver la relation entre la hauteur du pôle, la déclinaison du Soleil, le temps écoulé entre deux hauteurs égales de cet astre, son changement en déclinaison pendant ce temps, & la différence des temps qu'il emploie, l'un à s'élever de la hauteur observée au méridien, l'autre à descendre du méridien à la même hauteur.

La 1^{re}. formule peut avoir ces trois formes, selon la hauteur du pôle, le lieu du Soleil, & l'heure des observations :

$$r r h - r s x = c u y.$$

$$r r h - r s x = u c y.$$

$$r r h + r s x = c u y.$$

Dans ce problème, pendant que c , s & h demeurent les mêmes, u , x & y varient.

1.^o. La déclinaison du Soleil étant vers le pôle élevé, le Soleil vers le méridien supérieur, x croissant, u diminue : c'est

le cas de la 1^{re} forme ; & différentiant , on a

$$rs dx = cu dy + cy du.$$

2^o. La déclinaison étant vers le pôle élevé, le Soleil vers le méridien inférieur, x croissant, u croît : c'est le cas de la 2^{de} forme ; & différentiant , on a

$$rs dx = -cu dy + cy du.$$

3^o. La déclinaison étant vers le pôle abaissé, le Soleil toujours vers le méridien supérieur : x croissant, u croît : c'est le cas de la 3^{me} forme ; & différentiant , on a

$$rs dx = -cu dy + cy du.$$

Pour réduire les différentielles dx , dy , du aux petits arcs du méridien & de l'équateur ; nommant dD le petit arc du méridien qui est la différence en déclinaison ; & dE le petit arc de l'équateur qui exprime la différence des temps ; on a $dx = \frac{r}{\cos x} dD$, $dy = \frac{x}{r} dD$, & du

$du = \frac{r}{r'} dE$; qui , substitués dans les équations précédentes , donnent

$$1^{\circ}. dE = \left(\frac{rs}{cs} - \frac{x''}{ty} \right) dD.$$

$$2^{\circ}. dE = \left(\frac{rs}{cs} + \frac{x''}{ty} \right) dD.$$

$$3^{\circ}. dE = \left(\frac{rs}{cs} + \frac{x''}{ty} \right) dD.$$

Ou (mettant les tangentes S, T, X à la place des sinus)

$$1^{\circ}. dE = \left(\frac{s}{r} - \frac{x}{T} \right) dD.$$

$$2^{\circ}. dE = \left(\frac{s}{r} + \frac{x}{T} \right) dD.$$

$$3^{\circ}. dE = \left(\frac{s}{r} + \frac{x}{T} \right) dD.$$

On peut tirer de ce problème plusieurs usages utiles ou curieux , ou plutôt il contient cinq problèmes qu'indique & que résout la seule inspection de notre équation ; car des cinq quantités qu'elle contient , quatre étant données , déterminent la cinquieme.

Correction du midi.

L'un des problèmes précédents est de grand usage dans l'Astronomie. Pour régler leur horloge, les Astronomes observent quelques hauteurs du Soleil avant midi, & les instants de ces hauteurs; après midi ils observent les mêmes hauteurs, & les instants où le Soleil s'y trouve. Si la déclinaison du Soleil demeurait toujours la même, en partageant en deux également les intervalles du temps écoulé entre chacune des hauteurs correspondantes, le milieu seroit l'instant où le Soleil auroit passé au méridien; c'est-à-dire l'instant du midi: on trouve ainsi l'instant de la culmination des Etoiles fixes; car le changement en déclinaison qu'elles éprouvent dans l'intervalle des observations n'est pas sensible.

Il n'en est pas ainsi du Soleil; sa déclinaison change assez considérablement dans l'intervalle des observations, pour que l'instant auquel il passe au méridien ne soit pas également éloigné des instants auxquels il passe aux mêmes hau-

teurs. Dès que le Soleil s'approche de notre zénith , c'est-à-dire , lorsqu'il est dans les signes ascendants , il arrive après midi à la même hauteur où il a été vu le matin , plus tard qu'il n'auroit fait si sa déclinaison n'avoit pas changé : s'il retourne dans les signes descendants , il y arrive plutôt. Le milieu du temps écoulé entre les hauteurs correspondantes ne répond donc pas exactement à midi ; il faut , lorsque le Soleil s'approche de notre zénith , en retrancher quelque chose ; & lorsque le Soleil s'en éloigne , il faut y ajouter quelque chose pour que cette moitié réponde à l'instant du midi : ce qu'il faut retrancher ou ajouter , que les Astronomes appellent *la correction du midi* , est le petit intervalle entre l'instant où le Soleil se trouve à la hauteur observée , & celui où il seroit à la même hauteur si sa déclinaison n'avoit pas changé.

Les Astronomes n'observent leurs hauteurs correspondantes que peu d'heures avant & après midi ; & jamais lorsque le Soleil est vers le méridien inférieur ; parce qu'alors trop peu élevé sur l'horizon , il

est exposé à l'irrégularité des réfractions horizontales. Nous avons cependant supposé ce cas , parce qu'il se trouvoit dans le problème général.



^
P R O B L È M E X I I.

D *Eux hauteurs d'un astre étant données , trouver la relation entre le temps qui les sépare , la déclinaison de l'astre , & la hauteur du pole.*

La 1^{re}. formule donne deux équations entre la hauteur du pole , la hauteur de l'astre , sa déclinaison , & son angle horaire , pour les moments des deux observations.

L'intervalle étant donné , ou le sinus de l'arc qui lui répond , on a une équation entre ce sinus & les sinus des deux angles horaires.

Par ces trois équations , chassant les deux angles horaires , on a une équation qui donne la relation entre le temps qui sépare les hauteurs , la déclinaison de l'astre , & la hauteur du pole.

Exemple. Soit observé un astre dont la déclinaison est vers le pole élevé , dans deux hauteurs vers le méridien supérieur , toutes deux après le passage au méridien , l'arc qui répond au temps écoulé entre les observations

ne surpassant pas le quart-de-cercle.

Les deux hauteurs étant h & h' ; & les co-sinus des angles horaires étant u & u' ; la 1^{ere}. formule donne

$$u = \frac{rrh - rsx}{cy},$$

$$u' = \frac{rrh' - rsx}{cy}.$$

Et le sinus du temps écoulé entre les deux observations, étant p , son co-sinus q , & son sinus verse o ; l'on a *

$$ru = p \sqrt{(rr - u'u')} + qu'.$$

Et chassant de ces équations u & u' ; l'on a

$$\left. \begin{array}{l} oossxx - 2rrbosx \\ +rrppss - 2rrb'osx \\ +rrppxx \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{l} +r^4pp \\ +r^3qbb' \\ -r^4bb \\ -r^4b'h' \end{array} \right.$$

Dans cette équation , s & x sont combinés de la même maniere.

I. Si la déclinaison de l'astre , & le temps écoulé entre les deux observations , sont connus , & qu'on cherche la

* Voyez les théorèmes mis à la fin de cet ouvrage.

hauteur du pole : ordonnant cette équation par rapport à s ; l'on a

$$\begin{matrix} +00xx \\ +rrpp \end{matrix} \} ss \left\{ \begin{matrix} -2rrhox \\ -2rrh'ox \end{matrix} \right\} s = \begin{cases} +r^4pp \\ +2r^3qhb' \\ -r^4hh \\ -r^4h'h' \\ -rrppxx \end{cases}$$

Ou (faisant $00xx + rrpp = A$;
 $rhox + rh'ox = B$: & $rrpp + 2rqhh'$
 $- rrhh - rrh'h' - ppxx = C$) :

$$ss - 2r \frac{B}{A} s = rr \frac{C}{A}. \text{ Et}$$

$$s = r \frac{B}{A} \pm \frac{r}{A} \sqrt{(BB + AC)}.$$

Corollaire. Si l'astre est dans l'équateur , $x = 0$, & l'on a pour la hauteur du pole

$$s = \frac{r}{p} \sqrt{(pp + \frac{2qhb'}{r} - hh - h'h')}.$$

II. Si la hauteur du pole , & le temps écoulé entre les deux observations , sont connus , & qu'on cherche la déclinaison de l'astre ; l'on a

$$\begin{matrix} +00ss \\ +rrpp \end{matrix} \} xx \left\{ \begin{matrix} -2rrhos \\ -2rrh'os \end{matrix} \right\} x = \begin{cases} +r^4pp \\ +2r^3qhb' \\ -r^4hh \\ -r^4h'h' \\ -rrppss \end{cases}$$

Ou (faisant $ooss + rrrp = A$;
 $rhos + rh'os = B$; & $rrpp + 2rqhh'$
 $- rrhh - rrh'h' - ppss = C$) :

$$xx - 2r \frac{B}{A} x = rr \frac{C}{A} . \text{ Et }$$

$$x = r \frac{B}{A} \pm \frac{r}{A} \sqrt{(BB + AC)} .$$

Corollaire. Si l'observateur est sous
l'équateur , $s = o$; & l'on a pour la
déclinaison de l'astre

$$x = \frac{r}{p} \sqrt{(pp + \frac{2qbh'}{r} - hh - h'h')} .$$

III. Si la déclinaison de l'astre & la
hauteur du pôle sont connues , & qu'on
cherche le temps écoulé entre les deux
hauteurs de l'astre ; ordonnant l'équa-
tion par rapport à q , l'on a

$$\left. \begin{array}{l} - 2rssxx \\ - 2r^3h'h' \\ ccyyqq + 2rrhsx \\ + 2rrh'sx \end{array} \right\} q = \left\{ \begin{array}{l} - r^4yy \\ + r^4ss \\ - 2r^3hsx \\ - 2r^3h'sx \\ + r^4hb \\ + r^4h'h' \\ + rrsxx \end{array} \right.$$

Ou (faisant $ccyy = D$; $ssxx + rrhh'$
 $- rhsx - rh'sx = E$; & $- rryy$

$$+rrss - 2r h s x - 2r h' s x + r r h h' + s s x x = F):$$

$$q q - 2 r \frac{E}{D} q = r r \frac{F}{D}. \text{ Et}$$

$$q = \frac{r E}{D} \pm \frac{r}{D} \sqrt{(E E + D F)}.$$

Scholie. Ce problème est d'une grande utilité sur la Terre , & encore plus sur la mer , où il enseigne à trouver la hauteur du pôle lorsqu'on n'a pas pu observer les astres au méridien. Il donne aussi l'heure de l'observation , si l'on a l'ascension droite de l'astre ; car substituant les valeurs de s & de x dans l'une des deux équations $u = \frac{r r h - r s x}{c y}$, on a l'angle horaire de l'astre au moment de l'observation : & y ajoutant ou en soustrayant la différence d'ascension droite de cet astre & du Soleil , on a l'heure.

On a par ce problème le temps qu'un astre emploie à s'élever ou à s'abaisser d'une quantité donnée , & l'on peut par là déterminer exactement la

durée du lever ou du coucher du Soleil ; car cette durée , telle que nous l'avons donnée (*Probl. X.*) ne seroit pas assez exacte dans les lieux où le cours du Soleil est fort oblique.



PROBLÈME XIII.

Deux hauteurs d'un astre étant données , trouver la relation entre l'arc azymuthal qui les sépare , la déclinaison de l'astre , & la hauteur du pole.

La 2^{de}. formule donne deux équations entre la hauteur du pole , la déclinaison de l'astre , & son angle azymuthal, pour les moments des deux observations.

La différence ou la somme des angles azymuthaux étant donnée , ou le sinus de l'arc azymuthal qui sépare les deux hauteurs , on a une équation entre ce sinus & les sinus des deux angles azymuthaux.

Par ces trois équations , chassant les deux angles azymuthaux , on a une équation qui donne la relation entre l'arc azymuthal qui sépare les hauteurs , la déclinaison de l'astre , & la hauteur du pole.

Exemple. Soit observé un astre dont la déclinaison est vers le pole élevé ,

dans deux hauteurs vers le méridien supérieur, toutes deux après le passage au méridien, les azymuths tombant du côté opposé au pôle élevé; la différence des angles azymuthaux ne surpasant pas le quart-de-cercle.

Les deux hauteurs étant h & h' , leurs co-sinus k & k' ; & les deux co-sinus des angles azymuthaux étant n & n' ; la 2^{de}. formule donne

$$n = \frac{rbs - rrx}{ck},$$

$$n' = \frac{rbs' - rrx}{ck'}.$$

Et le sinus de la différence azymuthale entre les deux hauteurs, étant p , & son co-sinus q ; l'on a *

$$rn = p \sqrt{(rr - n'n')} + qn.$$

Et chassant de cette équation n & n' , par les deux équations de la formule; on a

$$\begin{array}{l} r^4kkxx \\ + r^4k'k'xx \\ - 2r^3qkk'xx \\ + rrhbh'k'k'ss \\ + ppkkk'k'ss \\ + rrh'h'k'k'ss \\ - 2rqb'h'k'k'ss \end{array} \begin{array}{l} - 2r^3bh'k'k'sx \\ + 2rrqbh'k'k'sx \\ - 2r^3b'k'k'sx \\ + 2rrqb'k'k'sx \end{array} - rrpqkk'k' = 0.$$

* Voyez les théorèmes à la fin de cet ouvrage.

PROBLÈME XIV.

Deux angles horaires & deux angles azymuthaux d'un astre étant donnés , aux moments de ses passages à deux verticaux , trouver la hauteur du pôle & la déclinaison de l'astre.

La 3^{me}. formule donne deux équations entre la hauteur du pôle , la déclinaison de l'astre , son angle horaire , & son angle azymuthal , pour les moments des deux observations : chassant donc la déclinaison , l'on a une équation dans laquelle il n'y a plus d'inconnue que la hauteur du pôle. Et la hauteur du pôle ainsi connue , en la substituant dans l'une des deux premières équations , on a la déclinaison de l'astre.

Exemple. Soit observé un astre dont la déclinaison est vers le pôle élevé , dans deux verticaux vers le méridien supérieur , tous deux après le passage

au méridien, les azymuths tombant du côté opposé au pôle élevé.

Les sinus & co-sinus des angles horaires étant t, u , & t', u' ; & les sinus & co-sinus des angles azymuthaux étant m, n ; & m', n' : la 3^{me}. formule donne

$$r n t y + r c m x = m s u y;$$

$$r n' t' y + r c m' x = m' s u' y.$$

Où (faisant la tangente de la déclinaison de l'astre $\frac{x}{y} = X$, & les cotangentes des angles azymuthaux $\frac{y}{n} = N$, $\frac{y}{n'} = N'$).

$$c X = s u - N t; \text{ \& } c X = s u' - N' t'.$$

$$\text{Ou } s u - N t = s u' - N' t'.$$

D'où l'on tire pour la hauteur du pôle:

$$s = \frac{N' - N' t'}{u - u'}.$$

Mettant ensuite cette valeur de s dans l'une des deux premières équations; l'on a pour la déclinaison de l'astre

$$X = \frac{Nt'n' - N't'n}{\sqrt{[(rn - r'n')^2 - (Nt - N't')^2]}}.$$

Cette méthode, pour trouver la hauteur du pôle & la déclinaison des astres, est exempte des défauts que la réfraction apporte dans toutes les autres.



PROBLÈME XV.

Deux astres dont on connoît les déclinaisons & les angles horaires , étant vus dans un même vertical , trouver la hauteur du pole.

La 3^{me}. formule donne deux équations entre la hauteur du pole , la déclinaison de chaque astre , son angle horaire , & son angle azyuthal pour le moment de l'observation : chassant par ces équations l'angle azyuthal , qui est le même dans l'une & dans l'autre , l'on a une équation dans laquelle il n'y a plus d'inconnue que la hauteur du pole.

Exemple. Soient observés dans un même vertical deux astres dont les déclinaisons sont vers le pole élevé , vers le méridien supérieur , tous deux après leur passage au méridien ; leurs azyuths tombant du côté opposé au pole élevé.

Les

Les deux sinus & co-sinus de déclinaison étant $x, y, & x', y'$; & les sinus & co-sinus des angles horaires étant $t, u, & t', u'$, la 3^{me} formule donne

$$r n t y + r c m x = m s u y,$$

$$r n t' y' + r c m x' = m s u' y'.$$

Ou (mettant pour $\frac{r x}{m}$ & $\frac{r x'}{m}$, les tangentes des déclinaisons X & X'),

$$\frac{s u - c X}{m} = \frac{s u' - c X'}{m}.$$

D'où l'on tire pour la tangente de la hauteur du pôle,

$$\frac{s u - c X}{c} = \frac{s u' - c X'}{c}.$$

Corollaire. Si l'un des astres est dans l'équateur, $X = 0$ & l'on a

$$\frac{s u}{c} = \frac{s u' - c X'}{c}.$$

PROBLÈME XVI.

LA hauteur du pôle étant connue, & deux astres dont les déclinaisons & les ascensions droites sont données, étant vus dans un même vertical, trouver l'heure de l'observation.

La 3^{me} formule donne deux équations entre la hauteur du pôle, la déclinaison de chaque astre, son angle horaire, & son angle azymuthal : passant par ces deux équations l'angle azymuthal, qui est le même dans l'une & dans l'autre, on a une équation dans laquelle il n'y a plus d'inconnus que les sinus des deux angles horaires.

L'ascension droite de chaque astre étant donnée, l'on a une équation entre les sinus des angles horaires, & le sinus de leur différence ou de leur somme qui est donnée.

Chassant donc par ces deux dernières équations, l'angle horaire d'un des astres, on parvient à une équation qui détermine l'angle horaire de l'autre ;

dont l'ascension droite étant donnée, l'on a l'heure de l'observation.

Exemple. Soient observés dans un même vertical deux astres dont les déclinaisons sont vers le pôle élevé, vers le méridien supérieur, tous deux après leur passage au méridien; leurs azymuths tombant du côté opposé au pôle élevé; la différence de leurs ascensions droites ne surpassant pas le quart de cercle.

Les deux sinus & co-sinus de déclinaison étant x, y , & x', y' , & les sinus & co-sinus des angles horaires étant u, u' , & t, t' , la 3^{me}. formule donne

et ainsi par conséquent

Où (mettant pour $\frac{x}{y}$ & $\frac{x'}{y'}$ les tangentes des déclinaisons X & X' &

on aura

Et le sinus de la différence des angles horaires des deux astres étant p , & son co-sinus étant q , l'on a

* Voyez les théorèmes à la fin de cet ouvrage.

$$rt = qt - p\sqrt{(rr - tt)}; \text{ \& } tu - ut = rp.$$

L'on a donc

$$rps = ct'X - ctX'; \text{ ou }$$

$$t = \frac{ct'X - rps}{cX'}$$

qui, substitué dans l'équation $rt = qt - p\sqrt{(rr - tt)}$, donne

$$rcX - rrps = cqt'X' - cpX'\sqrt{(rr - tt')}.$$

Où (faisant $rps = A$, $rcX = B$, $cqX' = C$, $cpX' = E$)

$$rA - B = C\sqrt{(rr - tt')};$$

D'où l'on tire

$$t = \frac{rA - B}{rC} \pm \frac{E}{rC} \sqrt{(BB + CC - AA)}.$$

Ayant ainsi l'angle horaire d'un des astres, ou le temps écoulé depuis son passage au méridien, en y ajoutant ou en en retranchant la différence d'ascension droite de cet astre & du Soleil, on a l'heure de l'observation.

Corollaire 1. Si l'un des astres est dans l'équateur, $X' = 0$; & l'on a d'abord

$$rt = qt - p\sqrt{(rr - tt)}.$$

D'où l'on tire une manière fort simple, d'avoir l'heure.

Corollaire 2. Si l'on prend $q = \frac{rX}{X'}$;
on a

$$t' = \sqrt{rr - \frac{r^2 ss}{cc X' X'}}.$$

Maniere encore fort simple d'avoir
l'heure.

Corollaire 3. Si les deux astres ont la
même ascension droite, $p = 0$, $q = r$;
& l'on a

$$r.c.t.X = r.c.t.X' :$$

D'où l'on voit que $t = 0$: en effet, les
deux astres sont dans le méridien au
moment de l'observation.



PROBLÈME XVII.

*D*eux astres dont on connoît les déclinaisons & les angles horaires au moment de l'observation, étant vus dans un même almicantarath, trouver la hauteur du pôle.

La 1^{re}. formule donne deux équations entre la hauteur du pôle, la déclinaison de chaque astre, son angle horaire & sa hauteur; chassant par ces équations la hauteur, qui est la même dans l'une & dans l'autre, l'on a une équation qui détermine la hauteur du pôle.

Exemple. Soient observés dans un même almicantarath deux astres dont les déclinaisons sont vers le pôle élevé, vers le méridien supérieur; tous deux après leur passage au méridien.

Les deux sinus & co-sinus de déclinaison étant x, y , & x', y' ; & les co-sinus des angles horaires étant u , & u' ; la 1^{re}. formule donne

$$rrh - rsx = cuy,$$

$$rrh - rsx' = cu'y,$$

$$rsx + cuy = rrh = rsx' + cu'y.$$

D'où l'on tire pour la tangente de la hauteur du pôle,

$$\frac{rs}{c} = \frac{r'x' - uy}{x - x'}.$$

Corollaire. Si l'un des astres est dans l'équateur, $x' = 0$, $y' = r$, & l'on a

$$\frac{rs}{c} = \frac{r'x' - uy}{x - x'}.$$



PROBLÈME XVII.

LA hauteur du pôle étant connue , & deux astres dont les déclinaisons & les ascensions droites sont données , étant vus dans un même almicanth , trouver l'heure de l'observation.

La 1^{re} formule donne deux équations entre la hauteur du pôle , la déclinaison de chaque astre , son angle horaire & sa hauteur : chassant par ces deux équations la hauteur , qui est la même dans l'une & dans l'autre , on a une équation dans laquelle il n'y a plus d'inconnus que les sinus des deux angles horaires.

L'ascension droite de chaque astre étant donnée , l'on a une équation entre les sinus des angles horaires , & le sinus de leur différence ou de leur somme qui est donnée.

Chassant donc par ces deux dernières équations l'angle horaire d'un des astres , on parvient à une équation qui

détermine l'angle horaire de l'autre ; dont l'ascension droite étant donnée , l'on a l'heure de l'observation.

Exemple. Soient observés dans un même almicantharath deux astres dont les déclinaisons sont vers le pôle élevé , vers le méridien supérieur , tous deux après leur passage au méridien ; la différence de leurs ascensions droites ne surpassant pas le quart-de-cercle.

Les deux sinus & co-sinus de déclinaison étant xy , & $x'y'$; & les co-sinus des angles horaires étant u , & u' ; la 1^{re}. formule donne

$$rrh - rsx = cuy,$$

$$rrh - rsx' = cu'y' ;$$

$$rsx + cuy = rrh = rsx' + cu'y' ; \text{ ou }$$

$$rsx - rsx' = cu'y' - cuy.$$

Et le sinus de la différence des angles horaires des deux astres étant p , & son co-sinus étant q ; l'on a *

$$ru = p \sqrt{(rr - u'u')} + qu' ; \text{ ou }$$

$$u = \frac{p}{r} \sqrt{(rr - u'u')} + \frac{qu'}{r} ;$$

* Voyez les théorèmes à la fin de cet ouvrage.

qui, substitué dans l'équation $rsx - rsx' = cu'y' - cu'y$, donne

$$rsx - rsx' = rcu'y' - cpy \sqrt{(rr - u'u')} - cqu'y;$$

ou (faisant $rsx - rsx' = A$, $rcy' - cpy = B$, $cpy = C$),

$$rA + Bu' = C \sqrt{(rr - u'u')};$$

D'où l'on tire

$$u' = -\frac{rAB}{BB+CC} \pm \frac{rC}{BB+CC} \sqrt{(BB+CC-AA)}.$$

Ayant ainsi l'angle horaire d'un des astres, ou le temps écoulé depuis son passage au méridien; en y ajoutant ou en retranchant la différence d'ascension droite de cet astre & du Soleil, on a l'heure de l'observation.

Corollaire 1. Si l'un des astres est dans l'équateur, $x' = 0$, & l'équation précédente est un peu plus simple.

Corollaire 2. Si l'on prend $q = \frac{r'}{r}$, l'équation est aussi plus simple.

Corollaire 3. Si les deux astres ont la même ascension droite, $p = 0$, $q = r$; & l'on a

$$u' = \frac{rc}{c} \left(\frac{x-x'}{y'-y} \right).$$

PROBLEME XIX.

LEs déclinaisons & les ascensions droites de trois Etoiles étant données , & le temps écoulé entre les moments où l'une des trois se trouve dans un même vertical avec chacune des deux autres , trouver l'heure de l'observation , & la hauteur du pole.

La 3^{me}. formule , pour le moment de la premiere observation , donne deux équations entre la hauteur du pole , la déclinaison de la premiere & de la seconde Etoile , l'angle horaire de chacune , & leur angle azymuthal , qui est le même : on chasse donc cet angle azymuthal par ces deux équations , & l'on a une équation entre la hauteur du pole , la déclinaison de la premiere & de la seconde Etoile , & l'angle horaire de chacune.

La même formule , pour le moment de la seconde observation , donne deux

autres équations entre la hauteur du pole , la déclinaison de la premiere & de la troisieme Etoile , l'angle horaire de chacune , & leur angle azymuthal , qui est le même : on chasse donc pareillement cet angle azymuthal par ces deux équations ; & l'on a une équation entre la hauteur du pole , la déclinaison de la premiere & de la troisieme Etoile , & l'angle horaire de chacune.

Les quatre équations sont donc réduites à deux ; qui ne contiennent plus que la hauteur du pole , les déclinaisons des trois Etoiles , & leurs angles horaires , aux moments des deux observations :

Et la hauteur du pole étant la même dans chacune de ces deux équations , on les réduit à une seule équation , qui ne contient plus que les déclinaisons des trois Etoiles , les angles horaires de la premiere & de la seconde au moment de la premiere observation , & les angles horaires de la premiere & de la troisieme au moment de la seconde observation .

L'ascension droite de chaque Etoile étant donnée , on chasse de cette équation

tion les angles horaires de la seconde & de la troisieme Etoile aux moments des deux observations, & l'on a une équation qui ne contient plus que des quantités connues avec les angles horaires de la premiere Etoile aux moments des deux observations.

Le temps écoulé entre ces moments étant donné, c'est-à-dire, la différence ou la somme de ces deux angles, on chasse l'un des deux, & l'on a une équation qui détermine l'angle horaire de la premiere Etoile au moment d'une des observations : ce qui (l'ascension droite de cette Etoile & du Soleil étant connue) donne l'heure de cette observation.

D'où l'on détermine l'angle horaire de la seconde ou de la troisieme Etoile au moment de son observation & tant les angles horaires de la premiere & de la seconde Etoile, ou de la premiere & de la troisieme, dans une des équations qui contiennent la hauteur du pôle, la déclinaison de ces Etoiles & leurs angles horaires on a la hauteur du pôle.

Exemple. Soient trois Etoiles dont les déclinaisons sont vers le pôle élevé, dont les différences d'ascension droite entre la première & la seconde, & entre la première & la troisième, ne surpassent pas le quart-de-cercle; soient ces Etoiles observées vers le méridien supérieur, & après leur passage au méridien, la première & la seconde dans un même vertical, & après un temps donné, la première & la troisième dans un autre vertical.

Soient les tangentes de leurs déclinaisons X, X', X'' ; les sinus & co-sinus de leurs angles horaires, t, t', t'', u, u', u'' ; ϕ, ϕ', ϕ'' ; les sinus & co-sinus des angles azymuthaux dans les deux observations, m, n, m', n' ; la 3^{me} formule donne pour le moment de la première observation

$$\frac{\sin \phi \sin \phi' \sin \phi''}{\sin \phi \sin \phi' \sin \phi''} = \frac{\sin \phi \sin \phi' \sin \phi''}{\sin \phi \sin \phi' \sin \phi''}$$

et pour le moment de la seconde observation

$$\frac{\sin \phi \sin \phi' \sin \phi''}{\sin \phi \sin \phi' \sin \phi''} = \frac{\sin \phi \sin \phi' \sin \phi''}{\sin \phi \sin \phi' \sin \phi''}$$

Ces quatre équations se réduisent donc à ces deux :

& ces deux à celle-ci :

$$\frac{t'X - tX'}{t''u - t'u'} = \frac{g'X - gX''}{g'u - g'u''}$$

Où (le sinus & le co-sinus de la différence d'ascension droite de la première & de la seconde étoile étant g & g' le sinus & le co-sinus de la différence d'ascension droite de la première & de la troisième étant g'' & g''')

$$\frac{g'X - gX''}{g'u - g'u''} = \frac{g'X - gX''}{g'u - g'u''}$$

Où (puisque $t' = \frac{dt}{dt} g u$ & $g' = \frac{dg}{dg} g u$) on a

* Voyez les théorèmes à la fin de cet ouvrage.

Mais t & ϑ étant les sinus des angles horaires de la première Etoile aux moments des deux observations ; l'intervalle entre ces moments étant donné, & le sinus & le co-sinus de l'arc qui lui répond étant p & q , l'on a $\vartheta = \frac{q^2 - p^2}{r}$, & $t = \frac{p^2 + q^2}{r}$: mettant donc ces valeurs dans l'équation précédente, on trouve pour la tangente de l'angle horaire de la première Etoile au moment de la première observation

$$\frac{r}{t} = r \left[\frac{r g g X - g g p X - g g q X - r g p X''}{r d g X - r r g X - g g q X + g p p X + r g q X''} \right]$$

Ayant ainsi l'angle horaire de la première Etoile au moment de la première observation ; l'on a aussi l'angle horaire de la seconde Etoile au même instant ; par l'équation $t' = \frac{q^2 - p^2}{r}$; & la hauteur du pôle, en substituant les valeurs de t & de t' dans l'équation


$$\sin \theta = \frac{r X - t X'}{r'' - t''}$$

Corollaire. Si l'on prend la première Etoile dans l'équateur, $X = 0$, & le calcul est beaucoup plus simple ; car la tangente

tangente de l'angle horaire de cette Etoile au moment de la première observation se réduit à

$$\frac{r t}{u} = r \left[\frac{g p X''}{r_2 X' - g q X''} \right].$$

Ce problème peut être fort utile sur terre & sur mer , parce qu'il n'y a point d'observation plus facile ni plus sûre que celle de deux astres dans un même vertical.



A
PROBLÈME XX.

T Rois hauteurs d'un astre étant données avec les deux intervalles de temps écoulés entre , trouver la déclinaison de l'astre , & la hauteur du pôle.

La 1^{re}. formule donne pour les moments des trois observations , trois équations , dont chacune contient la hauteur du pôle , la déclinaison de l'astre , son angle horaire , & sa hauteur. La hauteur du pôle & la déclinaison de l'astre étant les mêmes dans chacune , en les chassant l'une & l'autre , les trois équations sont réduites à une où il n'y a plus que les hauteurs qui sont données , & les trois angles horaires.

Les deux intervalles de temps écoulés entre les observations étant donnés , on a deux équations entre les angles horaires & leurs différences ou leurs sommes , qui répondent aux temps écoulés. Par ces équations chassant de l'équation précédente deux des angles

horaires aux moments de deux des observations , l'on a une équation qui détermine l'angle horaire de l'astre au moment de la troisieme observation.

Ayant ainsi l'un des angles horaires connu , en le mettant dans les deux équations qu'on a entre les angles horaires & leurs différences ou leurs sommes , on trouve les deux autres , & l'on a les trois angles horaires.

Deux de ces angles suffisent pour achever la solution du problème ; car reprenant deux des premieres équations que donnoit la formule , & mettant dans chacune la valeur connue de l'angle horaire qui lui convient , on a deux équations qui ne contiennent plus d'inconnues que la hauteur du pole & la déclinaison de l'astre ; & chassant par ces deux équations l'une de ces inconnues , l'on a une équation qui donne la déclinaison de l'astre , ou la hauteur du pole ; & l'une étant donnée , l'on a aussi-tôt l'autre.

Exemple. Soit un astre dont la déclinaison est vers le pole élevé , observé vers le méridien supérieur , après son

passage au méridien , dans trois hauteurs données ; les arcs qui répondent aux temps écoulés entre les observations ne surpassant pas le quart - de - cercle.

Soient les trois hauteurs h, h', h'' ; les trois co-sinus des angles horaires u, u', u'' : la 1^{re}. formule donne les trois équations

$$\begin{aligned} r s x &= r r h - c u y \\ r s x &= r r h' - c u' y \\ r s x &= r r h'' - c u'' y ; \end{aligned}$$

D'où chassant $r s x$, on a

$$\begin{aligned} r r h - c u y &= r r h' - c u' y \\ r r h - c u y &= r r h'' - c u'' y ; \end{aligned}$$

D'où chassant $c y$, on a

$$\frac{h-h'}{u-u'} = \frac{h-h''}{u-u''}.$$

Ou (faisant $h-h'=\dot{h}$, & $h-h''=\ddot{h}$)

$$\dot{h} u - \ddot{h} u = \dot{h} u'' - \ddot{h} u'.$$

Mais les intervalles de temps écoulés entre les observations étant donnés ; & le sinus & co-sinus de l'arc qui répond au temps écoulé entre la première & la seconde étant p & q ; & le sinus & co-sinus

de l'arc qui répond au temps écoulé entre la première & la troisième étant p' & q' , l'on a les deux équations $u' = \frac{q'u - p't}{r}$, & $u'' = \frac{q'u - p't}{r}$: Et substituant ces valeurs de u' & de u'' dans l'équation précédente, l'on a

$$r\dot{h}u - r\ddot{h}u = \dot{h}q'u - \ddot{h}qu + \dot{h}pt - \ddot{h}p't.$$

D'où l'on tire pour la tangente de l'angle horaire de l'astre au moment de la première observation

$$\frac{r}{u} = r \left[\frac{r\dot{h} - r\ddot{h} + \ddot{h}q - \dot{h}q'}{\dot{h}p - \ddot{h}p'} \right].$$

Connoissant ce premier angle horaire, on a le second & le troisième, en remontant aux équations $u' = \frac{q'u - p't}{r}$ & $u'' = \frac{q'u - p't}{r}$. Et l'on a les trois co-sinus u, u', u'' , dont deux suffisent pour le reste de la solution du problème.

Car la 1^{re}. formule donnant

$$rsx = r r h = c u y$$

$$rsx = r r h' = c u' y.$$

On a

$$sx = \frac{r h' u - r h u'}{u - u'}; \text{ \&}$$

L iij

$$cy = \frac{rrh - rrh'}{u - u'}.$$

Ou (faisant $\frac{rh'u - rh'u'}{u - u'} = rA$; &
 $\frac{rrh - rrh'}{u - u'} = rB$) :

$$sx = rA; \&$$

$$cy = rB: \text{ou}$$

$$rrxx - ccxx = rrAA; \&$$

$$cc(rr - xx) = rrBB.$$

Et chassant cc de ces deux équations,
on a

$$\left. \begin{array}{l} x^2 - rr \\ + \frac{AA}{BB} \end{array} \right\} xx + rrAA = 0,$$

Et faisant $rr + AA - BB = rC$,
On a

$$xx = \frac{rC}{2} \pm \frac{r}{2} \sqrt{(CC - AA)}.$$

On a ainsi la déclinaison de l'astre.

Il est facile ensuite d'avoir la hauteur du pole : car il est évident que dans les deux équations $sx = rA$, & $cy = rB$, les sinus & co-sinus de la déclinaison de l'astre & de la hauteur du pole se trouvent combinés de la même manière. On trouvera pour le sinus de la hauteur du

pole la même expression qu'on vient de
trouver pour le sinus de la déclinaison de
l'astre.

$$ss = \frac{r^2}{2} + \frac{r^2}{2} V(cc - dd)$$

Equivoque attachée à la nature de ce
problème. Si l'on veut donc en faire usi-
ge, il faudra choisir quelq'astre dont la
déclinaison diffère assez de la hauteur du
pole, pour que l'une ne puisse pas être
prise pour l'autre.

Scholie. C'est ce fameux problème au-
quel les Géomètres & les Astronomes de
l'Académie impériale de Russie se sont
tant appliqués, & dont ils ont donné
plusieurs belles solutions.

Je le crois cependant plus curieux
qu'utile; car sur la terre on a trop d'au-
tres moyens de trouver la déclinaison
des étoiles & la hauteur du pôle: pour
avoir recours à celui-ci: sur la mer, où
qu'on connoît l'étoile qu'on observe, on
a par les catalogues d'étoiles la déclinaï-
son, avec plus de précision qu'il n'est
nécessaire pour la latitude maritime; &
si l'on vouloit se servir d'une étoile qu'on

elles passent au premier almicantarath v & v' ; & les co-sinus, lorsqu'elles passent au 2^d. v'' & v''' .

La 1^{re}. formule donne pour le passage au premier almicantarath

$$r r h = r s x + c v y$$

$$r r h = r s x' + c v' y' : \text{ou}$$

$$\frac{r s}{c} = \frac{x' y' - v y}{x - x'}.$$

On a de même pour le passage au second almicantarath

$$\frac{T s}{c} = \frac{v'' y' - v' y}{x - x'}.$$

On a donc

$$\frac{y'}{y} = \frac{v - v'}{v' - v''}.$$

Nommant $t, t',$ & u, u' , les sinus & co-sinus des angles horaires des deux étoiles lorsqu'elles passent au premier azymuth: & t'', t''' , & u'', u''' , les sinus & co-sinus lorsqu'elles passent au second.

La 3^{me}. formule donne pour le passage au premier azymuth

$$\frac{r n}{n} = \frac{s u y - r c x}{s y}$$

$$\frac{r n}{m} = \frac{t n' y' - r c x'}{t' y'} : \text{ou}$$

$$\frac{s}{r c} = \frac{t' x y' - t' x' y}{t' n y y' - t' n' y y'}.$$

On a de même pour le passage au second azymuth

$$\frac{s}{r c} = \frac{t''' x y' - t'' x' y}{t''' n'' y y' - t'' n''' y y'}.$$

On a donc

$$\frac{t' x y' - t x' y}{t' n - t n'} = \frac{t''' x y' - t'' x' y}{t''' n'' - t'' n'''}.$$

Ou (nommant p le sinus de la différence des arcs horaires qui ont pour sinus t & t' : & p' le sinus de la différence des arcs horaires qui ont pour sinus t'' & t''' : ce qui donne * $r p = t' u - t u'$, & $r p' = t''' u'' - t'' u'''$) l'on a

$$p' t x y' - p' t x' y = p t''' x y' - p t'' x' y :$$

$$\frac{x'}{x} = \frac{y'}{y} \times \frac{p t''' - p' t'}{p t'' - p' t}.$$

Ou (mettant pour $\frac{y'}{y}$ sa valeur $\frac{v - v''}{v' - v''}$ prise dans l'équation des passages aux almicantaraths)

$$\frac{x'}{x} = \frac{v - v''}{v' - v''} \times \frac{p t''' - p' t'}{p t'' - p' t}.$$

* Voyez les théorèmes à la fin de cet ouvrage.

L'équation. des passages aux almi-
cantaraths donne

$$y'y' = \left(\frac{v-v''}{v-v'''} \right)^2 y'y = \left(\frac{v-v''}{v-v'''} \right)^2 (rr - xx) :$$

Celle des passages aux azymuths donne

$$x'x' = \left(\frac{v-v''}{v-v'''} \right)^2 \times \left(\frac{p'p'' - p'p'''}{p'p'' - p'p'''} \right)^2 xx :$$

On a donc

$$rr = \left(\frac{v-v''}{v-v'''} \right)^2 rr - \left(\frac{v-v''}{v-v'''} \right)^2 \\ xx + \left(\frac{v-v''}{v-v'''} \right)^2 \times \left(\frac{p'p'' - p'p'''}{p'p'' - p'p'''} \right)^2 xx.$$

Ou

$$x = \frac{r(p'p'' - p'p''') \sqrt{[(v-v''')^2 - (v-v'')^2]}}{(v-v'') \sqrt{[(p'p'' - p'p''')^2 - (p'p'' - p'p'')^2]}}.$$

Ayant ainsi la déclinaison d'une des
étoiles , on trouve facilement la déclinaison de l'autre ; & l'on a la hauteur du
pole par l'équation

$$\frac{rs}{s} = \frac{v'y' - vy}{x - x'}.$$

Scholie. Ce problème est un des plus
beaux & des plus utiles de l'Astronomie ,
puisqu'il dépend de la connoi-
ssance de la hauteur du pole , il sert à
trouver la déclinaison des étoiles ; & que

sans connoître la déclinaison des étoiles , il sert à trouver la hauteur du pole ; & cela par les moyens les plus simples , & sans avoir besoin d'aucuns arcs-de-cercle. On doit cette méthode à M. Mayer , à qui l'Astronomie doit tant d'autres excellentes choses. On peut dire cependant qu'il l'a plutôt indiquée que donnée. Elle est compliquée ; mais sa beauté & son utilité m'ont fait m'appliquer à la déduire de mes formules , d'où elle découle fort naturellement , & par lesquelles on parvient à un calcul assez simple.



PROBLÈME XXII.

***L**A déclinaison du Soleil étant donnée , trouver sur mer la hauteur du pôle par la durée du jour.*

Si l'on considère ce problème dans sa plus grande simplicité, c'est-à-dire , sans faire attention au changement du Soleil en déclinaison , au changement de lieu de l'observateur , & à l'altération que la parallaxe & la réfraction causent dans l'apparence de la hauteur du Soleil ; la solution est très - facile, & suit d'abord de notre 1^{re}. formule : car , pour l'instant du lever ou du coucher du Soleil , elle donne sans peine la relation entre la hauteur du pôle & la durée du jour par l'équation

$$r s x = c u y.$$

C'est ainsi , ou du moins dans ces circonstances , que les anciens déterminoient la hauteur du pôle : & Ptolémée , qui nous a laissé les hauteurs du pôle

d'un grand nombre de villes , préféroit cette méthode à toutes les autres.

Ils ignoroient les effets de la réfraction & de la parallaxe , & choifissoient pour cette observation le jour du solstice , parce que dans ce jour le Soleil ne change pas sensiblement de déclinaison. Cependant cette ignorance où ils étoient sur la réfraction & la parallaxe , & le peu d'exactitude avec laquelle ils connoissoient l'obliquité de l'écliptique & la mesure du temps , rendirent toutes leurs hauteurs du pole défectueuses.

Prenons donc maintenant le problème avec toutes ses circonstances : considérons que le Soleil , du matin au soir , change de déclinaison , que la réfraction le fait voir plus haut , & la parallaxe plus bas qu'il n'est en effet ; enfin , qu'entre les deux observations de son lever & de son coucher , l'observateur a changé de lieu lui-même.

Notre 1^{re}. formule $r s x = c u y$, qui exprime la relation entre la hauteur du pole , la déclinaison du Soleil , & son angle horaire , ou la durée de sa présence sur l'horizon , nous donnera la

relation de tous les changements qui arrivent dans ces quantités. Car supposant que ces changements ne sont pas considérables , & différentiant cette équation , l'on a

$$rs dx + rxd s = cu dy + cy du + uy dc.$$

Ou (mettant pour la différentielle des sinus & co-sinus de la déclinaison du Soleil le petit arc $dD = \frac{r dx}{y} = -\frac{r dy}{x}$: & pour la différentielle des sinus & co-sinus de la hauteur du pôle ou de la latitude le petit arc $dL = \frac{r ds}{c} = -\frac{r dc}{s}$: & pour la différentielle du co-sinus de l'angle horaire , le petit arc de l'équateur $dE = \frac{r d u}{t}$)

$$dE = \frac{r^3 s}{c t y y} dD \pm \frac{r^3 x}{c t y} dL , \text{ ou}$$

$$dE = \frac{r^3 s}{y \sqrt{(cc - xx)}} dD \pm \frac{r x}{c \sqrt{(cc - xx)}} dL.$$

Le signe est + ou — selon que le changement de latitude de l'observateur conspire ou est contraire au changement de déclinaison du Soleil.

Voilà les altérations que causent à la durée du jour le changement du Soleil
en

en déclinaison , & le changement de latitude de l'observateur : il y en a encore deux autres. L'une est celle que cause le changement en longitude de l'observateur ; l'autre est celle que causent la réfraction & la parallaxe.

Quant à l'altération causée à la durée du jour par le changement en longitude ; l'observateur connoissant la route qu'il a faite dans la journée , & à peu près la latitude où il est , il a la différence des longitudes du matin & du soir ; & le temps qui répond à cette différence est cette altération.

Quant à l'altération causée par la réfraction & par la parallaxe ; il faut remarquer que la réfraction élevant l'apparence du Soleil , & la parallaxe la baissant , si l'on retranche de sa réfraction la parallaxe , il ne reste plus à considérer que l'effet de cette différence , par lequel le Soleil paroît plus haut qu'il n'est ; & plutôt le matin & plus tard le soir qu'il ne devoit paroître. Mais la parallaxe du Soleil est si peu considérable ,

qu'on la peut négliger ici entièrement.

Il suffit donc de chercher de combien la réfraction horizontale allonge la durée du jour, tant le matin que le soir ; & pour cela , ayant la quantité de la réfraction horizontale , l'on a par les problèmes X ou XII , le temps que le Soleil emploie à s'élever ou à s'abaisser de cette hauteur ; & c'est l'altération que la réfraction cause à la durée du jour. Mais on a un moyen plus simple pour trouver cette altération par la seule observation.

Car négligeant, comme on le peut faire ici , les petites différences de la réfraction & des grandeurs apparentes du Soleil , son diamètre apparent se trouve assez exactement égal à la quantité dont la réfraction horizontale l'élève.

Au lever du Soleil donc , lorsqu'on voit son bord supérieur entamer l'horizon , son bord inférieur l'atteint actuellement , & son centre l'a déjà passé de la moitié de son diamètre ; si donc on

retranche de l'heure que marque la montre dans ce moment, la moitié du temps que le Soleil emploie à s'élever de tout son disque, on aura l'heure que marquoit la montre au moment de l'émersion du centre. De même au coucher du Soleil, lorsqu'on voit son bord supérieur disparaître dans l'horizon, son bord inférieur l'atteint actuellement, & son centre en est encore éloigné de la moitié de son diamètre: si donc à l'heure que marque la montre dans ce moment, on ajoute la moitié du temps que le Soleil emploie à s'abaisser de tout son disque, on aura l'heure que marque la montre au moment de l'immersion du centre.

La correction totale que la réfraction rend nécessaire à la durée du jour, déterminée par l'instant où le premier rayon du Soleil paroît dans l'horizon, & par l'instant où le dernier rayon y disparoît, est donc d'ajouter à l'intervalle entre ces deux instants la durée entière du lever ou du coucher du Soleil. C'est une chose remarquable

& heureuse pour le Navigateur , que la grandeur apparente du disque du Soleil soit une mesure de la réfraction horizontale , & qu'elle lui serve à en corriger les erreurs.

Si le changement en latitude de l'observateur dans la journée étoit trop grand , l'expression que nous avons donnée pour la correction qui en résulte seroit défectueuse , parce que nous avons supposé ce changement très-petit par rapport aux autres lignes : mais il seroit toujours très - facile au Navigateur qui voudroit trouver par cette méthode le lieu où il est , de diriger sa route du matin au soir de telle sorte qu'il ne s'approchât ni ne s'éloignât beaucoup du pôle.

Quant au changement du Soleil en déclinaison , il est évident que c'est une quantité aussi petite qu'il est ici nécessaire.

Et quant aux deux autres corrections , celle qu'on fait pour la réfraction , & celle pour le changement de longitude de l'observateur , elles seront toujours assez justes si on les fait avec


les précautions que nous avons marquées.

La plupart de ces corrections qu'il faut faire à la durée du jour observée, supposent qu'on ait déjà la hauteur du pôle, qui est ce qu'on cherche : on déterminera donc d'abord grossièrement la hauteur du pôle, telle que la donne la durée du jour sans les corrections ; & cette hauteur sera assez exacte pour qu'on puisse l'employer dans les corrections.

La durée du jour ainsi corrigée, l'on pourra s'en servir, comme si la déclinaison du Soleil étoit toujours la même, comme si l'observateur n'avoit pas changé de lieu, & comme s'il n'y avoit ni réfraction ni parallaxe. Et l'on aura sur la mer la hauteur du pôle avec plus d'exactitude que les anciens Astronomes ne l'avoient sur la terre au jour du solstice.


Malgré tout ce que j'ai fait pour rendre cette méthode universelle, elle a encore une restriction à laquelle la nature de la chose la borne : lorsque le

Soleil est dans l'équateur , la durée du jour étant la même par toute la terre, elle ne fauroit servir pour déterminer la hauteur du pole.



THÉOREME.

1. Les sinus de deux arcs, dont le plus grand ne surpasse pas le quart-de-cercle, étant $EB = a$, $FD = a$; leurs co-sinus $CB = b$, $CD = c$; le sinus de leur différence $EK = p$, son co-sinus $CK = q$; l'on a




$$ra = qa - pc$$

$$rb = pa + qc$$

$$rp = ab - ac$$

$$rq = aa + bc$$

2. Si l'un des deux arcs surpasse le quart-de-cercle, leur différence demeurant plus petite que le quart-de-cercle, le point D tombe de l'autre côté



de C; ζ devient négatif, tout le reste demeurant le même : & l'on a


$$ra = qa + p\zeta$$

$$rb = pa - q\zeta$$

$$rp = ab + a\zeta$$

$$rq = aa - b\zeta.$$

3. Si la différence des deux arcs surpasse le quart-de-cercle, le point D tombe de l'autre côté de C, le point



K aussi; ζ & q deviennent négatifs : & l'on a

$$ra = -qa + p\zeta$$


$$rb = pa + q\zeta$$

$$rp = ab + a\zeta$$

$$rq = -aa + b\zeta.$$

THÉORÈME.

1. Les sinus de deux arcs dont la somme ne surpasse pas le quart-de-cercle, étant $EB = a$, $FD = a$; leurs co-sinus $CB = b$, $CD = c$; le sinus de leur somme $EK = p$, son co-sinus $CK = q$; l'on a




$$ra = pc - qa$$

$$rb = pa + qc$$

$$rp = ac + ab$$

$$rq = -aa + bc.$$

2. Si chacun des deux arcs étant plus petit que le quart-de-cercle, leur somme surpasse le quart-de-cercle; le point D tombe du même côté de C, & le point K de



l'autre ; q devient négatif , tout le reste demeurant le même : & l'on a


$$ra = p\zeta + qa$$

$$rb = pa - q\zeta$$

$$rp = a\zeta + ab$$

$$rq = aa - b\zeta.$$

3. Si l'un des deux arcs surpasse le quart-de-cercle ; le point D tombe de l'autre côté de C , le point K aussi ; ζ & q deviennent négatifs : & l'on a



$$ra = -p\zeta + qa$$

$$rb = pa + q\zeta$$

$$rp = -a\zeta + ab$$

$$rq = aa + b\zeta.$$

F I N.


DISCOURS SUR LA PARALLAXE DE LA LUNE ,

Pour perfectionner la théorie de la
Lune & celle de la Terre.

*Haud scio an omnium quæ in Cælo pernosci
potuerunt magistra.*

Plin. de Lunæ nat. lib. 2.

IMPRIMÉ POUR LA PREMIERE FOIS
AU LOUVRE EN M. DCC. XLI.



SUR LA PARALLAXE DE LA LUNE.

ON trouvera dans l'ouvrage suivant des regles pour perfectionner la théorie de la Lune & celle de la Terre. On y verra la relation que ces deux planetes ont entre elles ; combien il est nécessaire , pour déterminer les lieux de la Lune , de connoître la figure de la Terre ; & comment les observations de la Lune pourroient déterminer cette figure , si elle n'étoit pas déterminée.

Je me suis fondé , & je crois qu'on peut se fonder sur la figure de la Terre qui résulte de la comparaison de notre mesure du degré du méridien au cercle polaire , & de celle que M. Picard avoit prise de l'arc du méridien entre Paris & Amiens , corrigée par les observations que nous avons faites sur son amplitude. Si cependant quelqu'un vouloit suivre d'autres me-

fures , toutes les regles que je donne s'y appliqueroient avec la même facilité ; & ces mesures , qui feroient la Terre plus allongée vers les poles que les nôtres ne la font applatie , rendroient encore nos regles plus nécessaires. Enfin , on trouvera dans l'ouvrage suivant un moyen pour décider entre toutes les différentes mesures , quelles sont celles qui ont fait connoître la vraie figure de la Terre.

Toutes les méthodes qu'on a suivies jusqu'ici pour déterminer cette figure , sont fondées sur la comparaison de deux degrés de la Terre l'un avec l'autre , & supposent dans tous les degrés intermédiaires une inégalité proportionnée à celle qu'on trouve entre les deux degrés extrêmes. Cette supposition paroît si légitime , que personne encore n'a fait difficulté de l'admettre : mais si quelqu'un la révoquoit en doute , il trouveroit dans l'ouvrage suivant une méthode pour déterminer la figure de la Terre , qui n'y est point assujettie.

Cet ouvrage se réduit à trois points.

principaux. 1°. A l'usage des mesures de quelques arcs de la surface de la Terre pour perfectionner la Géographie & la Navigation. 2°. A l'usage des expériences des pendules pour déterminer les quantités & les directions de la gravité. 3°. On y verra comment on doit se servir des dimensions de la Terre pour perfectionner la théorie de la Lune.

Il y a deux méthodes pour parvenir à la connoissance des mouvemens de la Lune ; la première est de remonter à leurs causes , & de rechercher par les loix de la Méchanique , quels ils doivent être : c'est la méthode que M. Newton & quelques autres grands Géometres ont suivie.

La seconde est de découvrir par les observations quels sont les mouvemens de la Lune , & de tâcher de réduire ses irrégularités apparentes à quelque regle : c'est aux Astronomes à nous fournir les observations qui peuvent nous conduire dans cette recherche ; & quelques - uns ont déjà beaucoup avancé un travail aussi utile.

Laquelle de ces deux méthodes qu'on suive, on ne sauroit parvenir à la théorie de la Lune que par ses lieux exactement déterminés dans les Cieux : ce sont les bases sur lesquelles cette théorie sera fondée ; c'est cette partie que j'ai entreprise, & pour laquelle j'espère donner dans l'ouvrage suivant des regles plus exactes que celles dont on s'est jusqu'ici servi.

Mais cette théorie de la Lune est-elle une chose de si grande importance, & mérite-t-elle tant de travaux & tant de recherches ? Je serois trop long si je voulois parcourir ici toutes ses utilités pour l'Astronomie ; & pour l'économie universelle des Cieux. Il suffira de dire que la science des longitudes sur mer en dépend ; & d'expliquer quelle est la connexion entre les longitudes & cette théorie.

Tout le monde sait que la différence en longitude de deux lieux de la Terre, est l'angle que forment les plans des méridiens de ces lieux. La Terre tournant en 24 heures autour de son axe d'un mouvement uniforme, & présentant

présentant au Soleil successivement les plans de tous les méridiens , l'angle compris entre deux de ces plans est donné par le temps qui s'écoule depuis que le Soleil semble passer d'un méridien à l'autre.

Si donc on pouvoit transporter une horloge réglée sur le midi de quelque lieu , sans que l'égalité de son mouvement fût altérée , la différence qu'on trouveroit entre l'heure marquée par cette horloge , & l'heure du lieu où elle arriveroit , donneroit de la manière la plus simple la différence en longitude de ces lieux.

Les horloges à pendule sont des instruments si parfaits , qu'elles peuvent pendant plusieurs mois conserver l'heure sur laquelle elles ont été réglées. Mais si elles sont capables d'une si grande justesse lorsqu'elles demeurent dans les lieux où elles sont , la cause même de cette régularité , le pendule qui les règle , les déränge continuellement si on les transporte. Jusqu'ici aucune de celles qui ont pour principe de leur exactitude le mouvement

d'un pendule , n'a pu conserver pendant les voyages une assez grande égalité dans son mouvement , pour apporter fidèlement l'heure d'un lieu à un autre. Et toutes les autres sur qui l'agitation auroit moins d'effet , sont par leur construction exposées à des irrégularités qui les rendent incapables de conserver l'heure assez exactement , quand même elles ne seroient pas transportées.

On peut suppléer au transport des horloges , en observant quelque phénomène par le moyen duquel on puisse comparer les heures auxquelles il est apperçu dans différents lieux. On a par la différence de ces heures , la différence en longitude de ces lieux.

Les éclipses de la Lune & du Soleil sont les premiers phénomènes de cette espece qui se présenterent. Mais la rareté de ces éclipses , & le peu d'exactitude avec laquelle on avoit autrefois la mesure du temps , faisoient qu'il n'y avoit qu'un petit nombre de lieux dont la position fût connue , & encore étoit-elle assez imparfaitement. La

Géographie étoit dans une grande confusion , lorsqu'on découvrit de nouveaux astres capables de tout réformer ; ce furent les satellites de Jupiter , dont on fit une si heureuse application aux longitudes. Au lieu d'un très-petit nombre d'éclipses que le Soleil & la Lune présentoient à nos yeux chaque année , il n'y avoit plus de mois où ces astres n'offrissent plusieurs spectacles de cette espece. Ils font autour de Jupiter des révolutions si fréquentes , que tous les jours quelqu'un d'eux s'éclipse dans l'ombre de cette planete , pour reparoître bientôt après , & ces immersions & émerfions sont autant de phénomènes instantanés , qui déterminent les longitudes des lieux où on les observe.

Aussi dans un fort court espace de temps , on vit faire à la Géographie de plus grands progrès qu'elle n'en avoit faits pendant un grand nombre de siècles. Il ne falloit , comme on voit , que comparer les heures auxquelles une même immersion ou émerfion de quelque satellite avoit été ob-

servée dans les lieux dont on cherchoit la différence en longitude. Mais M. Cassini rendit la chose encore plus utile, en construisant des tables du mouvement des satellites ; par lesquelles le calcul des immersions & émerSIONS pour le méridien de quelque lieu, supplée à l'observation immédiate qui auroit été faite dans ce lieu, & dispense en quelque sorte d'une des observations.

Il n'y a donc rien à désirer aujourd'hui, si ce n'est peut-être quelque précision superflue, lorsqu'on voudra déterminer la longitude de quelque lieu sur la terre. Mais il n'en est pas ainsi sur la mer.

Quoique le Navigateur parti de quelque port, sût par le calcul à quelle heure le phénomène y est vu ; pour pouvoir y comparer l'heure à laquelle ce phénomène est vu au lieu où il est, dont il ignore la situation, il faut une observation immédiate, & c'est ce que l'agitation du vaisseau ne permet point.

La longueur des lunettes jusqu'ici nécessaire pour pouvoir observer les im-

mersions & les émersions des satellites , & la petitesse du champ de leur vision , font qu'à la moindre agitation du vaisseau l'on perd de vue le satellite , supposé qu'on l'ait pu trouver.

Jusqu'ici l'on a vu que la détermination des longitudes sur mer ne dépendoit que de l'une ou de l'autre de ces deux choses , ou d'une horloge dont le mouvement ne fût point troublé par l'agitation de la mer , ou d'une lunette avec laquelle on pût , malgré cette agitation , observer les satellites de Jupiter. L'un ou l'autre de ces deux moyens donneroit sur le champ la longitude au Navigateur le moins habile. Mais il se trouve dans l'un & l'autre de grandes difficultés. En voici un troisième qui dépend de plus de circonstances , mais par lequel je crois qu'il y a beaucoup plus d'espérance de réussir.

Il n'y a dans les Cieux aucun phénomène plus subit , ni plus facile à observer , que l'occultation des Etoiles lorsque la Lune passe au devant d'elles ,

& leur réapparition lorsque la Lune cesse de se trouver entr'elles & nous. On peut observer ce phénomène avec une très-courte lunette, on peut l'observer à la vue simple lorsque l'Etoile est fort brillante, & que la partie éclairée du disque de la Lune n'est pas assez grande pour la ternir. Mais il n'est pas nécessaire que la Lune passe précisément au devant d'une Etoile pour marquer un instant déterminé. Le mouvement de cette planète est si rapide, que si l'on rapporte sa situation à deux Etoiles fixes, elle forme avec ces deux Etoiles un triangle qui, changeant continuellement de figure, peut être pris pour un phénomène instantané, & déterminer le moment auquel on l'observe. Il n'y a plus d'heure de la nuit, il n'y a plus d'heure où la Lune & les Etoiles soient visibles, qui n'offre à nos yeux un tel phénomène; & nous pouvons par le choix des Etoiles, par leur position & par leur splendeur, prendre entre tous les triangles celui qui fera le phénomène le plus propre pour l'observation.

Pour parvenir maintenant à la connoissance des longitudes , il faut deux choses ; l'une , qu'on observe sur mer avec assez d'exactitude le triangle formé par la Lune & les deux Etoiles ; l'autre , qu'on connoisse assez exactement le mouvement de la Lune pour savoir quelle heure marqueroit la pendule réglée dans le lieu d'où l'on est parti , lorsque la Lune forme avec les deux Etoiles le triangle tel qu'on l'observe.

Quant à ce qui regarde l'observation ; on a sur mer assez exactement l'heure du lieu où l'on est , & par conséquent l'heure à laquelle elle se fait. Depuis quelques années , l'on a un instrument avec lequel on peut , malgré l'agitation du vaisseau , prendre les angles entre la Lune & les Etoiles , avec une justesse assez grande pour déterminer le triangle dont nous avons parlé. M. de Fouchy s'est appliqué à le perfectionner ; & dans l'état où il est , il donne une exactitude assez grande pour que cette partie de la méthode soit remplie.

La difficulté se réduit à la théorie de la Lune ; à connoître assez exactement ses distances & ses mouvements , pour pouvoir calculer à chaque instant sa position dans le Ciel , & déterminer à quel instant pour tel ou tel lieu le triangle qu'elle forme avec deux Etoiles fixes , sera tel ou tel.

Nous ne dissimulerons point que c'est en ceci que consiste la plus grande difficulté. Cet astre qui a été donné à la Terre pour satellite , & qui semble lui promettre les plus grandes utilités , échappe aux usages que nous en voudrions faire , par les irrégularités de son cours. Aucunes tables publiées n'ont donné jusqu'ici assez exactement les lieux de la Lune , pour pouvoir déterminer la longitude avec une précision suffisante. Cependant si l'on pense aux progrès qu'a fait depuis quelque temps la théorie de la Lune , on ne sauroit s'empêcher de croire que le temps est proche où cet astre qui domine sur la mer , & qui en cause le flux & reflux , enseignera au Navigateur à s'y conduire.

Quelles que soient les causes des irrégularités de son mouvement , les observations ont appris qu'après 223 lunaisons , c'est-à-dire , 223 retours de la Lune vers le Soleil , les circonstances du mouvement de la Lune , redevenant les mêmes par rapport au Soleil & à la Terre , ramènent dans son cours les mêmes irrégularités qu'on y avoit observées 18 ans auparavant. Une suite d'observations continuées pendant une telle période avec assez d'assidue & d'exactitude , donnera donc le mouvement de la Lune pour les périodes suivantes.

Ce travail si long & si pénible d'une période entière bien remplie d'observations , fut entrepris par M. Halley , lorsqu'il étoit déjà dans un âge si avancé , qu'il ne se flattoit plus de le pouvoir terminer. Ce grand & courageux Astronome nous avertit que n'étant encore qu'à la fin d'une autre période qui ne contient que 111 lunaisons , & qui ne donne pas si exactement que celle de 223 , le retour des mêmes inégalités , il pouvoit déjà déterminer sur

mer la longitude , à 20 lieues près vers l'équateur , à 15 lieues près dans nos climats , & plus exactement encore , plus près des poles. On sent quelle est l'autorité d'un homme qui a joint au plus profond savoir dans l'Astronomie , toute la pratique de la Navigation. Jaloux de ses observations , ou voulant peut-être les réserver toutes pour sa nation , il ne les a point publiées.

Mais on n'aura rien à désirer , & l'on aura l'ouvrage le plus utile pour les longitudes , si le travail qu'a entrepris M. le Monnier s'accomplit. Depuis qu'il s'est attaché à la théorie de la Lune , il a fait un si grand nombre d'excellentes observations , qu'on ne sauroit espérer de voir cette partie de la période mieux remplie ; & le dernier succès de ce travail ne dépend plus que de sa vie & de sa santé. Et comme il est nécessaire que la situation des Etoiles fixes qui doivent former le triangle avec la Lune soit bien connue , il a déjà déterminé les déclinaisons & les ascensions droites de plu-

seurs, avec l'exaëtitude qu'on fait qu'il apporte dans l'Astronomie.

Il faut avouer que la méthode que nous proposons pour les longitudes, demandera plus de science & de soin qu'il n'en eût fallu, si l'on eût pu trouver des horloges qui conservassent sur mer l'égalité de leur mouvement, ou des lunettes avec lesquelles on pût observer sur mer les satellites. Mais ce sera aux Mathématiciens à se charger de la peine des calculs : & pourvu qu'on ait les éléments sur lesquels la méthode est fondée, l'on pourra par des tables ou des instruments, réduire à une grande facilité la pratique d'une théorie difficile.

Cependant la prudence vaudra qu'au commencement on ne fasse qu'un usage fort circonspect de ces instruments ou de ces tables ; & qu'en s'en servant on ne néglige aucune des autres pratiques par lesquelles on estime la longitude sur mer. Un long usage en fera connoître la sûreté. On ne s'est sans doute servi qu'en tremblant des instruments les plus simples de la Navigation, lors-

qu'on leur a confié sa vie pour la première fois.

Si la Lune étoit beaucoup plus éloignée de la Terre , ou si la Terre étoit beaucoup plus petite qu'elle n'est , dans quelque lieu que fût placé celui qui observe la Lune , il la verroit au même point des Cieux ; & les lieux vrais , & les lieux observés seroient les mêmes. Mais la grosseur de la Terre & la proximité de la Lune , font qu'elle est vue dans différents lieux du Ciel , selon les lieux de la Terre où est placé celui qui l'observe.

Les méthodes que je donne dans l'ouvrage suivant , serviront à réduire plus exactement qu'on ne l'a fait jusqu'ici , ces lieux les uns aux autres. Si la théorie de la Lune donne ses lieux par rapport au centre de la Terre , nos méthodes serviront à déterminer pour chaque point de la surface de la Terre , les lieux où l'observateur la verra , & par conséquent le triangle qu'elle formera avec les Etoiles. Si au contraire on a les lieux observés de la Lune , nos méthodes les réduiront aux lieux

vrais , & serviront à former une théorie exacte.

On verra dans cet ouvrage de quelle utilité il seroit pour la perfection de la théorie de la Lune , qu'on eût des observations de cet astre , faites en même temps dans les lieux les plus éloignés.

Je n'ai plus qu'un mot à dire sur cet ouvrage. L'exactitude qu'on y propose est-elle nécessaire , ou n'est-elle qu'une exactitude superflue ? N'y poussons-nous point la spéculation au delà des besoins de la pratique , ou même au delà de ce que la pratique peut atteindre ? Quelqu'étrange qu'il paroisse de justifier la précision dans des Sciences qui ont la précision pour objet , j'ai vu si souvent attaquer nos recherches par de tels discours , que je crois devoir y répondre.

Quand il seroit vrai que pour les besoins actuels , ce fût assez qu'il se trouvât entre tous les moyens dont on se sert , une précision proportionnée , on ne doit pas borner la perfection de ces moyens à l'état présent : on doit

regarder la science comme un édifice auquel tous les Savants travaillent en commun. Chacun attaché à quelque partie , travaille à la perfection du tout : & si quelques-uns , placés peut-être aux endroits les plus difficiles , ont moins avancé leur ouvrage , cela ne doit ni arrêter , ni ralentir l'ouvrage des autres.

Mais il y a une réponse plus directe à faire à l'objection précédente , c'est que la pratique de l'Astronomie est aujourd'hui poussée à un si haut point de perfection , qu'elle a besoin des méthodes les plus exactes ; & que loin qu'il soit à craindre que l'exactitude de notre théorie surpasse ni l'exactitude des instruments , ni l'adresse des observateurs , la précision dans cette partie a prévenu & surpassé celle que nous proposons ; puisqu'il y a des cas où , déterminant les lieux de la Lune par les autres méthodes , les erreurs qu'on commettrait seroient huit ou dix fois plus grandes que celles des observations.

La théorie de la Lune est si importante , qu'on ne sauroit employer trop

de soin pour y parvenir. Il faut penser que c'est avoir fait quelque chose de grand , que d'avoir fait une petite partie d'une grande chose. Cet ouvrage ne s'achèvera qu'avec le temps , & par des degrés insensibles. Il semble qu'il en soit des progrès de l'esprit dans nos recherches , comme du mouvement des corps dans la Méchanique : leur vitesse est toujours d'autant moindre que leur poids est plus grand.

Pour n'omettre rien des utilités qu'on doit retirer de notre mesure de la Terre , j'avois dessein de l'appliquer à la Navigation , & de donner des méthodes pour diviser le méridien nautique , & pour construire les cartes réduites ; mais un savant Géometre anglois m'a prévenu par un ouvrage qui va paroître dans notre langue. J'en suis dédommagé par l'honneur qu'il fait à nos mesures , & par la satisfaction que j'ai de voir qu'une nation aussi éclairée que la sienne en fasse déjà usage pour perfectionner sa Navigation.

DISCOURS



DISCOURS

SUR LA PARALLAXE

DE LA LUNE,

*Pour perfectionner la théorie de la
Lune & celle de la Terre.*

§ I.

*Utilités dont est la connoissance de la
figure de la Terre.*

A connoissance de la figure de
L la Terre est aussi nécessaire pour
déterminer les distances & les
grosseurs des autres astres, qu'elle l'est
pour déterminer sur notre globe les di-

Oeuv. de Maupert. Tome IV. ○

stances des lieux dont on ne connoît que la latitude & la longitude. Toutes les dimensions du système solaire ne sont fondées que sur celles de la Terre ; c'est le diamètre de la Terre qui leur sert à toutes de mesure commune.

Et quand on voudroit rapporter les distances & les grosseurs des différents corps célestes au diamètre du Soleil ou de quelqu'autre planète , pour connoître entièrement ces dimensions , il faudroit toujours en revenir à celle de la Terre , qui est la seule planète dont nous ayons la mesure absolue.

C'est sans doute pour cela que les plus anciens Astronomes ont tant fait de tentatives sur la mesure de la Terre. Dès les commencemens de l'Astronomie , on a vu que cette recherche étoit aussi utile pour la connoissance générale de l'Univers , qu'elle l'étoit pour la connoissance particulière de la planète que nous habitons.

Mais si des déterminations gro-

ffictes de la figure de la Terre. suffisoient aux anciens Philosophes, les connoissances qu'on a aujourd'hui font desirer des mesures plus exactes : lorsqu'une partie de nos connoissances se perfectionne, les autres doivent recevoir de nouveaux degres de perfection.

Si, par exemple, on n'avoit pas eu dans ces derniers temps, des mesures de la Terre plus exactes que celles qu'avoient les anciens, on ne seroit pas parvenu à comparer la pesanteur qui fait tomber les corps vers la surface de la Terre, avec la force qui retient la Lune dans son orbite; on n'auroit pas découvert que ces deux forces n'étoient que la même.

Car pour comparer ces forces, il falloit connoître les espaces que chacune pouvoit, dans un même temps, faire parcourir à un corps qui seroit livré à elle seule. L'un de ces espaces se connoît par le temps qu'emploie un pendule d'une longueur donnée à faire ses oscillations; car on sait par là de quelle hauteur un corps placé vers

la surface de la Terre , tombe dans un temps donné. L'autre espace est celui que la force qui retient la Lune dans son orbite , lui feroit parcourir , si elle perdoit tout son mouvement , & n'éprouvoit plus que l'action de cette force. Cet espace se connoît par l'arc que la Lune décrit pendant ce même temps ; car la Lune tendant continuellement à décrire la tangente de son orbite , la fleche de l'arc qu'elle décrit est l'espace dont la force qui la tire la fait tomber vers la Terre. Or pour pouvoir comparer cette fleche à l'espace contemporain dont la pesanteur fait tomber les corps près de la surface de la Terre , il ne suffit pas d'avoir la distance de la Lune à la Terre , évaluée en diametres de la Terre , il faut avoir la longueur absolue de cette distance , réduite aux mêmes mesures que celles de la longueur du pendule.

On voit par cet exemple , qu'il ne suffit pas de connoître le rapport des différentes dimensions des corps célestes , mais qu'il y a des occasions où

il en faut avoir les mesures absolues. Et plus la Physique céleste se perfectionnera, & plus on en sentira la nécessité.

Tout le monde fait combien la détermination de la figure de la Terre est utile pour la Géographie, & par conséquent pour la Navigation, qui est une partie de la Géographie. Mais la détermination de la figure de la Terre peut avoir d'autres utilités très-grandes, & qu'on ne soupçonneroit pas d'abord.

L'une de ces utilités, c'est que par la connoissance de la figure de la Terre on peut déterminer les points vers lesquels tend la pesanteur, & même la gravité primitive dans les différents lieux de la Terre.

Les règles de l'Hydrostatique apprennent que dans chaque lieu de la Terre, la pesanteur agit perpendiculairement à sa surface: ainsi, pour avoir les directions de la pesanteur sur la Terre, il n'est question que d'avoir celles des perpendiculaires au méridien; elles déterminent la di-

section de la pesanteur dans chaque lieu.

Mais la Terre ayant un mouvement de révolution autour de son axe, chaque partie dont elle est formée a acquis par ce mouvement une force centrifuge qui tend à l'écarter du centre de sa révolution : cette force se trouve donc combinée dans la pesanteur, lorsqu'on l'éprouve par des expériences sur la surface de la Terre, & en a changé la direction. On peut appeller *gravité*, la pesanteur non altérée, pour la distinguer de la pesanteur telle que nous l'éprouvons.

Or la figure de la Terre étant déterminée, le rapport de la force centrifuge, à la pesanteur sous l'équateur étant connu, & le rapport des pesanteurs en différents lieux de la Terre étant donné par les expériences des pendules, on peut déterminer pour chaque lieu la direction de la pesanteur, celle de la gravité, & la quantité de la gravité.

Cette recherche est de si grande importance, qu'elle peut conduire à la

connoissance de la force qui meut & dirige tous les corps de l'Univers, & nous faire découvrir sa nature & ses loix.

Si au contraire cette force étoit assez connue, on pourroit peut-être par le moyen de ses quantités & de ses directions, parvenir à des choses qui paroissent ensevelies dans de profondes ténèbres, & découvrir quelque chose de la constitution intérieure de la Terre.

Cette méthode de philosopher paroît plus sûre que celle qu'on a employée jusqu'ici, lorsqu'on a entrepris de déterminer la figure de la Terre par les loix d'une gravité qui n'est peut-être pas encore assez connue, & par la constitution intérieure de la Terre, qui est totalement ignorée.

Il paroît au contraire qu'il falloit chercher par les expériences tout ce qui pouvoit donner quelque lumière sur ces choses; & ces expériences, outre celles des pendules, étoient les mesures de la Terre, soit par des méthodes semblables à celles dont nous nous som-

mes servis en Lapponie , soit par la méthode que je proposerai ici.

Enfin la dernière utilité dont est la détermination de la figure de la Terre , consiste dans le rapport qu'a cette figure avec les distances de la Lune à la Terre , & avec les angles sous lesquels différents observateurs placés sur la Terre voient la Lune. On peut juger par là combien la connoissance de la figure de la Terre est utile pour perfectionner la théorie de la Lune , qui est aujourd'hui la chose la plus importante qui reste à découvrir dans l'Astronomie , & dont dépend la connoissance des longitudes sur mer.

Nous croirons donc avoir fait quelque chose qui pourra contribuer à l'avancement de la théorie de la Lune , si nous donnons ici des méthodes par lesquelles on puisse mesurer les distances de la Lune à la Terre avec plus d'exactitude , & déterminer l'orbite de la Lune avec plus de précision qu'on ne l'a fait jusqu'ici.

On ne sauroit se flatter d'avoir la

théorie de la Lune , sans un grand nombre de lieux de la Lune déterminés dans les Cieux le plus exactement qu'il sera possible : ce sont ces points qui feront découvrir cette théorie , ou qui serviront à la confirmer.

Or on ne sauroit déterminer avec exactitude les vrais lieux de la Lune , sans la connoissance de la figure de la Terre.

§ II.

Ce que c'est que la parallaxe.

LES Etoiles fixes sont placées à un si grand éloignement , que de quelque lieu de la Terre qu'on les observe , chacune paroît toujours dans le même point du Ciel , ou plutôt dans la même ligne droite. Cet éloignement est si prodigieux , que quoique la Terre se meuve dans une ellipse immense , & que par conséquent elle se trouve en des lieux du Ciel fort différents

en différentes saisons de l'année, si de ces différents lieux on observe quelque Etoile fixe, on la voit toujours dans la même ligne droite, pourvu qu'on fasse aux directions dans lesquelles on la voit deux corrections, l'une pour la précession des équinoxes, par laquelle toutes les Etoiles paroissant se mouvoir autour des pôles de l'écliptique, leurs déclinaisons & leurs ascensions droites sont altérées, chacune d'une quantité connue : l'autre correction nécessaire, est celle de l'*aberration de la lumière*. Cette aberration, qui n'a été découverte que depuis peu d'années par le célèbre Astronome M. Bradley, est une altération apparente dans la déclinaison & l'ascension droite de chaque Etoile pendant le cours de l'année. M. Bradley a découvert les loix & la quantité de cette altération, & a fait voir qu'elle n'étoit produite que par la vitesse avec laquelle la lumière de l'Etoile vient à nous, combinée avec la vitesse de la Terre dans son orbite. Ces deux mouvements de la Terre & de la lumière font que nous ne voyons

pas précisément l'Etoile dans la direction d'où elle a lancé sa lumière ; & selon que la direction du mouvement de la Terre conspire ou est contraire à la direction du mouvement de la lumière , on voit l'Etoile en différents lieux.

Jé ne parle point ici d'un autre mouvement bien moins perceptible que les deux précédents , dont M. Bradley m'a parlé dans quelques lettres qu'il m'a fait l'honneur de m'écrire. Presque aussi-tôt que M. Bradley a découvert ce mouvement , ou plutôt l'apparence de ce mouvement , il en a soupçonné la cause ; & selon ce qu'il m'a écrit , toutes les observations confirment ses premiers soupçons , & en font une théorie. Mais quel que soit ce mouvement , qu'il ne seroit pas juste que le Public connût par un autre que celui qui en a fait la découverte , il suffit de dire ici qu'il ne dépend pas plus que les deux premiers des différents lieux où se trouve la Terre pendant sa révolution autour du Soleil.

Tout cela prouve que le globe de

la Terre n'est qu'un point par rapport à la distance de la Terre aux Etoiles fixes , du moins à celles des Etoiles fixes qu'on a observées ; & que la vaste orbite que décrit la Terre autour du Soleil , n'est qu'un point elle-même par rapport à cette distance.

Il n'en est pas ainsi lorsqu'on observe quelqu'astre voisin de la Terre : dès que la distance est comparable avec notre globe , on remarque des variétés dans la position de la ligne selon laquelle on le voit. Si deux observateurs placés dans différents lieux de la Terre observent la Lune en même temps , les deux lignes dans lesquelles ils la voient sont inclinées l'une à l'autre , & vont se rencontrer à la Lune.

Si l'on suppose un observateur placé au centre de la Terre , qui observe la Lune dans le même moment auquel un autre placé sur la surface de la Terre l'observe aussi , les deux lignes dans lesquelles ils la voient vont se couper au centre de la Lune , & y former un angle qu'on appelle la *parallaxe de la Lune*.

Pourvu que l'observateur qui est sur la surface ne se trouve pas placé directement dans la ligne droite qui joint les centres de la Terre & de la Lune, il y aura toujours une parallaxe & un *triangle parallaxique*. Voici ce que c'est que ce triangle. Imaginez trois lignes, la première tirée du centre de la Terre à la Lune, la seconde de la Lune au point de la surface de la Terre où est placé l'observateur, la troisième de ce point de la surface au centre de la Terre : ces trois lignes forment un triangle dont le petit angle est la parallaxe de la Lune ; & comme le demi-diamètre de la Terre sert de base à cet angle, si tous les angles du triangle sont connus, on aura la distance de la Terre à la Lune en demi-diamètres de la Terre.

Mais si l'observateur voit la Lune dans l'horizon, pendant qu'on suppose l'autre placé au centre de la Terre, l'angle que forment les deux lignes dans lesquelles ils voient la Lune, est la *parallaxe horizontale* : alors le triangle parallaxique est rectangle, & son

angle droit est dans la surface de la Terre.

On peut entendre la même chose de tous les autres astres qui ont une parallaxe : cette parallaxe donne leur distance à la Terre , & leur distance donne leur grosseur , mais le tout en demi-diamètres de la Terre : & pour avoir les distances & les grosseurs absolues , il faut connoître le diamètre de la Terre , que nous considérons jusqu'ici comme un globe.

On voit par là que la parallaxe des astres est le fondement de toute l'Astronomie , & ce qui conduit à la connoissance de toute l'économie des Cieux. Mais je me borne à ce qui regarde la Lune , d'autant plus qu'on peut appliquer facilement tout ce que j'en dirai aux autres astres.

Jusqu'ici j'ai supposé que la Terre étoit parfaitement sphérique. Mais si elle ne l'est pas , il est clair que tous ses demi-diamètres ne seront plus égaux , & que selon la latitude des lieux où sera placé l'observateur , le demi-diamètre de la Terre qui sert de base à la

parallaxe sera différent , & qu'il faudra avoir égard à cette différence dans tout ce qui regarde le triangle parallactique.

La Terre étant un sphéroïde aplati vers les poles , aux mêmes distances de la Lune à la Terre , les parallaxes horizontales vont en croissant du pôle à l'équateur ; & si la Terre avoit une figure opposée , si elle étoit un sphéroïde allongé , ces parallaxes croîtroient de l'équateur au pôle.

Je n'examine point si les déterminations qu'on a eues jusqu'ici de la parallaxe étoient assez exactes pour mériter qu'on eût égard aux différences qu'y produit l'inégalité des demi-diamètres de la Terre , ou pour faire appercevoir cette inégalité.

Jusqu'ici cet élément fondamental de toute l'Astronomie n'a été connu ni avec l'exactitude qu'il mérito , ni avec celle qui étoit possible ; & n'étant connu qu'imparfaitement , on n'a pu l'appliquer à tous les usages auxquels il pouvoit être utile.

M. Newton avoit proposé de faire

entrer l'inégalité des demi-diamètres de la Terre dans la considération des parallaxes de la Lune , & dans le calcul des éclipses. D'après la figure de la Terre qu'il avoit déterminée , il nous a donné quelques-unes des parallaxes horizontales. Mais si l'on considère les erreurs auxquelles sont sujettes les parallaxes de la Lune déterminées par les méthodes ordinaires , on verra que les différences que M. Newton nous a données pour ces parallaxes ne peuvent guère nous être utiles.

M. Newton croyoit cependant qu'on pouvoit découvrir par là quelle est la figure de la Terre. Mais je doute que la chose fût possible , si l'on vouloit faire usage des parallaxes horizontales , déterminées par les méthodes ordinaires. M. Manfredi avoit entrepris aussi de se servir des parallaxes de la Lune pour découvrir la figure de la Terre * ; mais malgré toute l'estime que j'ai pour la mémoire de ce savant Astronome , la méthode qu'il propose est si embarrassée & si dépendante d'éléments sus-

* *Mém. de l'Acad.* 1734.

pects , que je doute qu'on en puisse jamais tirer grande utilité. Aussi M. Manfredi lui-même ne la croyoit-il propre à découvrir l'allongement ou l'applatissement de la Terre , qu'en cas que la Terre se fût écartée de la figure sphérique , autant que le supposoit la figure allongée vers les poles , que lui donnoit M. Cassini.

Après tout ce qu'on a fait pour perfectionner l'Astronomie , il est étonnant qu'on n'ait pas entrepris avec plus d'ardeur ou plus de succès de déterminer exactement la parallaxe de la Lune.

La maniere la plus sûre seroit d'observer de deux lieux de la Terre , situés sur le même méridien , & séparés d'un assez grand arc , la distance en déclinaison de la Lune à une même Etoile.

On peut s'assurer avec la dernière précision , que les observateurs sont placés sur le même méridien ; car le mouvement de la Lune est si rapide , que sa distance en ascension droite d'une même Etoile n'est la même que pour les lieux situés précisément sur

le même méridien , & que la moindre différence entre les méridiens seroit sensible par les différences qui se trouveroient dans les temps écoulés entre les passages au méridien de l'Etoile & de la Lune.

On peut s'affurer aussi d'avoir avec une très-grande précision les distances en déclinaison entre une Etoile & la Lune , ces observations se faisant avec le micrometre. *La somme ou la différence de ces distances est la parallaxe de la Lune , qui a pour base l'arc du méridien qui sépare les observateurs.*

Il est vrai que pour placer des observateurs précisément sur un même méridien , il faudroit faire d'abord quelques tentatives : la chose est assez importante pour mériter qu'on en fasse. Mais , quand il se trouveroit quelque différence en longitude entre les lieux des observateurs , & quand , entre leurs observations , la Lune auroit eu quelque mouvement en déclinaison , on pourroit , en observant ce mouvement , en tenir compte.

La parallaxe étant déterminée , on

petit axe , qui differe fort peu du grand qui est le diametre de l'équateur.

Soit décrit autour de cet ellipsoïde le globe $E \Delta \Pi$, qui ait le même équateur ; on fait que si d'un point D de l'ellipsoïde on tire la ligne DG , perpendiculaire au méridien en D , le rayon du globe , tiré de C parallèlement à la ligne DG , déterminera sur le globe le point Δ , qui a la même latitude que le point D sur l'ellipsoïde.

Soient tirées du point Δ la droite ΔQ , parallèle à l'axe ; du point D la droite DS , qui lui soit perpendiculaire ; du point C par le point M , où l'ordonnée du cercle rencontre l'ellipse , la droite CN ; & soit prolongée la perpendiculaire à l'ellipse DG , jusqu'à ce qu'elle rencontre l'axe en H .

Soit $CE = r$

$P \Pi = \rho$

$Q \Delta = s$, sinus de latitude ,

$$\text{Donc } MB = MO + OB = M\Delta,$$


$$N\Delta = MD, \& MN = BD,$$

$$CG = \frac{r}{g}$$

$$CH = \frac{r}{g}$$

$$G/H = 2\delta.$$

On voit facilement que pour une latitude donnée, le degré du méridien sur l'ellipsoïde est égal au degré décrit du rayon CM , auquel il faut ajouter le petit arc $2\Delta N$, qui répond au degré qu'on cherche, & dont il faut retrancher le petit arc $2\Delta' N'$, qui répond au degré suivant. Prenant donc G pour le degré du globe $E\Delta N$, & le rapport de r à g pour celui du rayon au degré, l'on aura pour le degré du méridien de l'ellipsoïde, $G - \frac{r}{g} MN + 2\Delta N - 2\Delta' N'$; c'est-à-dire, prenant s & c pour les sinus & co-sinus du degré qu'on cherche, & s' & c' pour les sinus & co-sinus du degré suivant, on a



$$G = \frac{2rs\delta}{r^2} + \frac{2cs\delta}{rr} - \frac{2cs\delta}{rr}$$

Ayant donc la mesure de deux degrés du méridien sur la Terre à différentes latitudes, on déterminera la figure de la Terre qui en résulte par deux équations, dont l'une étant retranchée de l'autre, on aura la valeur de δ , qui donne ensuite la grandeur du degré & du rayon du globe, la figure de l'ellipsoïde, & la longueur de tous ses degrés.


On peut encore déterminer la figure de la Terre d'une autre manière, ayant la mesure de deux degrés du méridien à différentes latitudes; car chaque degré du méridien de l'ellipsoïde est le degré du cercle osculateur de l'ellipse pour cette latitude; & le rayon osculateur de l'ellipse étant égal au cube de la normale DG de l'ellipse divisé par le quarré du parametre; on a pour notre ellipse le rayon osculateur

$$= (DG)^3 : \frac{(CP)^2}{(CE)^2} = r - 2\delta + \frac{ss\delta}{rr}.$$

On peut donc, avec les deux degrés connus, que je suppose M & m , & les sinus S & s , faire deux équations, dont l'une étant retranchée de l'autre,

on aura la valeur de $\delta = \frac{r^3(M-m)}{3M(SS-ss)}$, qui donne ensuite le rayon du globe & la figure de l'ellipsoïde.

Et si l'un des degrés dont on a la mesure est pris à l'équateur, on a $M-m = \frac{2mSS\delta}{r^3}$. Ce qui rend la construction de la table des degrés du méridien fort facile.




Si l'on fait $g'ss = 2rcs - 2rc's'$,
ou $r - 2d + \frac{2ss}{rr} = r$, on trouve
sur l'ellipsoïde le lieu où le degré du
méridien est égal à celui du globe ; &
ce lieu est celui dont le sinus de latitude
est $= r\sqrt{\frac{2}{3}}$, c'est-à-dire, celui qui est
placé vers le 55^{me}. degré de latitude.

Comme la quantité $DO = \frac{c s s d}{r^3}$ est la différence du rayon du cercle parallèle à l'équateur sur l'ellipsoïde , au rayon du parallèle à l'équateur sur le globe à la même latitude ; si au lieu d'avoir deux degrés du méridien , on avoit deux degrés de longitude , on en pourroit facilement déduire à peu près comme ci-dessus , la valeur de d & la figure de la Terre. Et cette valeur de d une fois déterminée , soit ainsi , soit par les moyens précédents , on a facilement la longueur de tous les degrés de longitude.

§ IV.

Dimensions pour la gravité.

Les calculs précédents nous ayant donné toutes les dimensions de la Terre , on peut s'en servir pour trouver les points vers lesquels tend la pesanteur dans les



différents lieux de la Terre, ou les lignes CG , distances du centre de la Terre aux points où les perpendiculaires DG rencontrent le diamètre de l'équateur.

On peut facilement aussi déterminer les points vers lesquels tend la gravité, ou les lignes CF , & les petits angles GD , F , que forment les directions de la pesanteur avec celles de la gravité.

Car soit la pesanteur en $D = P$, la

force centrifuge sur l'équateur, dont on connoît le rapport avec la pesanteur, $= F$, on aura la force centrifuge en D

$$= \frac{DS}{CE} \times F.$$

Et à cause que $P : \frac{DS}{CE} \times F :: DG : GF$,
on aura $GF = DS \times \frac{F}{P}$, &

$$GF = c \times \frac{F}{P},$$


$$CF = \frac{cs}{r} + c \times \frac{F}{P}.$$

Et l'angle $GDF = \frac{cs}{rr.P}$.

S V.

Dimensions pour les parallaxes.

PRenant pour la Terre l'ellipsoïde EDP , on peut estimer de quatre manières la parallaxe horizontale de la Lune. 1°. Pendant qu'un observateur est placé sur la surface de la Terre dans un point



D, on peut supposer l'autre placé au centre. 2°. On peut le supposer placé au centre du cercle osculateur de la Terre au point **D**. 3°. On peut le supposer placé au point où la verticale du point **D** rencontre l'axe de la Terre. 4°. Enfin on peut le supposer placé au point où la verticale du point **D** rencontre le diamètre de l'équateur. Les lignes qui servent de bases aux parallaxes seront donc

$$\text{La } 1^{\text{re}}. = r - \frac{ssd}{rr}.$$

$$\text{La } 2^{\text{de}}. = r - 2d + \frac{3ssd}{rr}.$$

$$\text{La } 3^{\text{me}}. = r + \frac{ssd}{rr}.$$

$$\text{La } 4^{\text{me}}. = r - 2d + \frac{ssd}{rr}.$$

Il est facile par là de calculer toutes les différentes parallaxes ; & l'on verra quelles sont les différences qui se trouvent entre les lignes qui servent de bases aux parallaxes horizontales , ou quelles sont les différences que l'inégalité de ces bases produit dans les parallaxes. Et l'on peut juger par là combien il est nécessaire d'avoir égard à ces différences lorsqu'on veut déterminer avec précision les distances de la Lune à la Terre , & toutes les autres distances des astres.

Mais pour tirer toute l'utilité de ces calculs , & pour n'avoir plus rien à desirer sur la parallaxe de la Lune , il faudroit avoir une de ces parallaxes bien déterminée. Et l'on ne sauroit parvenir ni

aspirer à une plus grande exactitude , qu'en déterminant la parallaxe , comme nous avons dit § II.

L'utilité dont peuvent être ces choses nous a fait prendre la peine de calculer une table de toutes les lignes qui peuvent servir , tant pour la parallaxe de la Lune , que pour les directions de la gravité , & pour la grandeur des degrés de la Terre. Dans ce calcul , nous avons pris 1 pour le rayon de l'équateur & $\frac{1}{178}$ pour la quantité dont le diamètre de l'équateur surpasse l'axe , comme nos observations la donnent.

Mais comme dans les différents ellipsoïdes qui diffèrent peu de la sphere , toutes ces lignes sont proportionnelles à cette quantité , la table les donnera par une seule regle de Trois , pour quelque différence qu'on voulût supposer entre l'axe & le diamètre de l'équateur.


TABLE pour la parallaxe , pour la gravité , & pour la grandeur des degrés.

Latic. du Lieu.	<i>MN</i>	<i>N Δ</i>	<i>DO</i>
0°	0,00000	0,00000	0,00000
5	0,00004	0,00049	0,00004
10	0,00017	0,00096	0,00017
15	0,00038	0,00140	0,00036
20	0,00066	0,00181	0,00062
25	0,00103	0,00215	0,00091
30	0,00140	0,00243	0,00122
35	0,00185	0,00264	0,00151
40	0,00232	0,00277	0,00178
45	0,00281	0,00281	0,00199
50	0,00330	0,00277	0,00212
55	0,00377	0,00264	0,00216
60	0,00421	0,00243	0,00211
65	0,00461	0,00215	0,00195
70	0,00496	0,00181	0,00170
75	0,00524	0,00140	0,00136
80	0,00545	0,00096	0,00095
85	0,00557	0,00049	0,00049
90	0,00562	0,00000	0,00000

TABLE

TABLE pour la parallaxe , pour la gravité , & pour la grandeur des degrés.

Latir. du Lieu.	CG	CH	GH
0°	0, 01124	0, 00000	0, 01124
5	0, 01119	0, 00098	0, 01124
10	0, 01107	0, 00195	0, 01124
15	0, 01085	0, 00291	0, 01124
20	0, 01056	0, 00384	0, 01124
25	0, 01018	0, 00475	0, 01124
30	0, 00973	0, 00562	0, 01124
35	0, 00920	0, 00645	0, 01124
40	0, 00861	0, 00722	0, 01124
45	0, 00794	0, 00794	0, 01124
50	0, 00722	0, 00861	0, 01124
55	0, 00645	0, 00920	0, 01124
60	0, 00562	0, 00973	0, 01124
65	0, 00475	0, 01018	0, 01124
70	0, 00384	0, 01056	0, 01124
75	0, 00291	0, 01085	0, 01124
80	0, 00195	0, 01107	0, 01124
85	0, 00098	0, 01119	0, 01124
90	0, 00000	0, 01124	0, 01124



§ VI.

Maniere de déterminer la distance de la Lune au centre de la Terre.

LA figure de la Terre étant donnée , les lignes tirées de chacun des observateurs à la Lune , & les verticales des lieux où ils observent , forment un quadrilatere dont les angles & deux côtés étant

Q ij

donnés , on peut déduire tout le reste.

Soient deux observateurs, l'un placé en E sur l'équateur , l'autre dans quelquelieu D sur le même méridien , à une distance considérable de l'équateur : que chacun observe la distance de la Lune à une même Etoile , & la distance de cette Etoile à son zénith.

Il est clair que la somme des distances de l'Etoile au zénith donnera l'angle DGE , qui est l'amplitude de l'arc du méridien qui sépare les deux observateurs , & que la somme ou la différence des distances de la Lune à l'Etoile , est la parallaxe , qui a cet arc du méridien pour base.

On a donc le quadrilatere $EGDL$, donné par tous ses angles , & par les côtés EG & GD , ce qui suffit pour le déterminer.

Lorsqu'on aura ainsi déterminé la distance de la Lune au point G , on peut facilement la rapporter au point C , cen-


toujours placé sur l'équateur en E , l'autre étoit placé sur le globe en Δ , à la même latitude où est celui qui observe réellement sur la Terre.

Et pour cela, ayant tiré du point Δ à la Lune la droite ΔL , il est clair que la parallaxe sur le globe surpasseroit la vraie parallaxe du petit angle $\Delta L D$. Lorsqu'on aura donc cet angle, il n'y aura qu'à l'ajouter à la parallaxe observée, & à la distance de la Lune au zénith de l'observateur en D ; & l'on aura le quadrilatère $C E L \Delta C$, & sa diagonale $L C$, qui est la distance de la Lune au centre de la Terre.

S VII.

Recherche de la différence des parallaxes sur la Terre & sur le globe.

IL faut maintenant chercher le petit angle $D L \Delta$, différence de la parallaxe sur la Terre & sur le globe.



Ayant tiré du point M sur les deux lignes DL & ΔL , les deux perpendiculaires MI & MK , cet angle sera $\frac{MI+MK}{ML}$, dans lequel la distance du point M ou du point C à la Lune, sera

toujours assez exacte. C'est donc *MI* & *MK* qu'il faut chercher.

Soit prolongée la verticale du point *D*, & soit tirée la ligne *DV*, parallèle à *CE*; & d'un point quelconque *R* de la droite *DL*, soient abaissées sur ces deux lignes les perpendiculaires *RX*, *RV*; & l'on aura, à cause des triangles semblables *DMI*, *RDV*, & *Δ MK*, *RDV*,

$$MI = \frac{cs \cdot DX}{rr \cdot DR} \vartheta, \quad \& \quad MK = \frac{s \cdot DV}{r \cdot DR} \vartheta.$$

Soit maintenant le sinus de la déclinaison de la Lune *RV* = *x*, & son co-sinus *DV* = *y* pour le rayon *r*, & l'on aura

$$MK = \left(\frac{sy}{rr} \right) \vartheta,$$

$$MI = \left(\frac{ccsy + cssx}{r^4} \right) \vartheta,$$

$$\& \quad MI + MK = \left(\frac{rrsy + cc sy + cssx}{r^4} \right) \vartheta.$$

C'est cet angle *DLΔ* qu'il faut ajouter à toutes les parallaxes observées, pour


§ VIII.

Conditions qui rendent la différence des parallaxes la plus grande qu'il soit possible.

SI l'on suppose que pendant qu'un des observateurs est en *E* sur l'équateur, l'autre soit en *D* sur une latitude donnée, & qu'on cherche quelle doit être la déclinaison de la Lune pour que l'angle *DLΔ* soit le plus grand qu'il soit possible, il n'y a qu'à chercher le *maximum* de *MI + MK*, en faisant *s* & *c* constants; & l'on trouvera qu'il faut que le sinus de la déclinaison de la Lune soit

$$x = \frac{cs}{\sqrt{(rr+3cc)}}.$$

C'est là le rapport qui doit être entre le sinus de la déclinaison de la Lune & le sinus de la latitude de l'observateur, pour que l'angle *DLΔ* soit le plus grand, pour quelque latitude donnée du point *D* que ce soit.



Mais si l'on veut trouver sur quel lieu de la Terre il faut placer l'observateur, pour que la différence des parallaxes sur la Terre & sur le globe soit la plus grande en général, il faut substituer dans l'expression de $MI + MK$, la valeur de

$x = \frac{cs}{\sqrt{rr+3cc}}$, & la valeur de $y = \frac{rr+cc}{\sqrt{rr+3cc}}$, qui lui répond, & chercher le maximum de $MI + MK$, en supposant s & c variables.


On trouvera que le lieu où il faut placer l'observateur en D, afin que l'angle $DL\Delta$ soit le plus grand qu'il soit possible, est celui dont le sinus de latitude est $S = r \sqrt{\frac{2}{3}}$.

Mettant cette valeur de s , & celle de $c = r \sqrt{\frac{1}{3}}$ qui lui répond, dans l'expression du sinus de la déclinaison de la Lune, qui donne le plus grand angle $DL\Delta$ pour une latitude donnée, c'est-

à-dire, dans l'expression $x = \frac{cs}{\sqrt{rr+3cc}}$,

on trouve pour le sinus de la déclinaison de la Lune, qui pour la situation la plus avantageuse du point D, est aussi la plus avantageuse, on trouve $x = \frac{1}{3}r$.

C'est une chose remarquable, que le lieu D , qui donne la plus grande diffé-




rence entre la parallaxe sur la Terre & la parallaxe sur le globe , est celui où le cercle parallele à l'équateur sur la Terre differe le plus du parallele correspondant sur le globe ; & celui où le degré du méridien de

la Terre est égal au degré du globe. Ce lieu est placé vers la latitude de $54^{\circ} \frac{1}{4}$.

Quant à la déclinaison de la Lune, qui donne alors la plus grande différence de parallaxe, c'est celle d'environ $19^{\circ} \frac{1}{2}$.

On voit par là qu'un des observateurs étant sur l'équateur, quand on pourroit placer l'autre au pôle, la différence des parallaxes ne pourroit jamais être aussi grande qu'elle l'est lorsque l'observateur est placé vers le 55^{me} . degré.

Car supposant pour l'un & pour l'autre cas, les situations de la Lune les plus avantageuses, c'est-à-dire, pour l'observateur placé au pôle, la Lune dans l'équateur, & pour l'observateur placé vers le 55^{me} . degré, la déclinaison de la Lune d'environ $19^{\circ} \frac{1}{2}$; la différence de parallaxe, dans ce dernier cas, est à la différence de parallaxe dans le premier, comme 2 à $\sqrt{3}$.



§ IX.

Calcul de la différence des parallaxes.


Voyons maintenant quelles sont les différences de parallaxes, ou les différentes grandeurs de l'angle $DL\Delta$.

Prenant 1 pour CE , & $\frac{1}{178}$ pour δ , & cherchant la différence de la parallaxe dans toutes les circonstances les plus avantageuses, c'est-à-dire, lorsque $s = \sqrt{\frac{2}{3}}$, & $x = \frac{1}{3}$, on trouve $MI + MK = 0,00649$.

Supposant maintenant, comme M. Newton, que dans les syzygies, lorsque la Lune est à sa moyenne distance de la Terre, la parallaxe horizontale sur l'équateur soit de $57' 20''$, on trouvera le petit angle $DL\Delta$, de $23''$.

Il est clair qu'aux mêmes latitudes & aux mêmes déclinaisons de la Lune, la différence des parallaxes est proportionnelle à la différence qui est entre le diamètre de l'équateur & l'axe. Ainsi ayant une fois les différences de parallaxes que nous donnons ici, on aura par la règle de 3 toutes ces différences pour quelque rapport qu'on prenne entre l'axe & le diamètre de l'équateur.

Remarque.




Remarque.

On verra facilement qu'entre la Terre, telle que nous l'avons déterminée, & la Terre allongée de M. Cassini, qui faisoit le diamètre de l'équateur plus petit que l'axe d'environ $\frac{1}{100}$, il y auroit pour

Oeuv. de Maupert. Tome IV.

R



chaque latitude un angle $D E A$, environ trois fois plus grand que celui que nous trouvons entre la Terre & le globe; & que supposant que les observations se fissent dans les circonstances qui don-

ment le plus grand angle, cet angle seroit de $64''$; c'est-à-dire, que si la Terre avoit la figure que lui donnoit Mr. Cassini, les deux observateurs placés en *E* & en *D*, verroient la parallaxe plus grande de plus d'une minute qu'ils ne la voient sur la Terre aplatie, telle que nous l'avons déterminée.

§ X.

Méthode pour déterminer la figure de la Terre.

SI la figure de la Terre cause quelque altération aux parallaxes, & les rend différentes de ce qu'elles seroient si la Terre étoit un globe, il s'ensuit que les parallaxes peuvent servir à connoître si la Terre s'écarte de cette figure. Mais c'est un problème qu'il me semble qu'il faut traiter tout autrement qu'il n'a été traité jusqu'ici, si l'on veut le résoudre avec certitude. Un petit nombre de secondes

sur lesquelles on peut compter , & d'où dépend absolument la question , est préférable à des quantités plus grandes que peuvent donner d'autres méthodes , mais qui demandent qu'on fasse usage d'éléments suspects.

Il est certain , par exemple , que si l'on avoit assez exactement quelque-une des parallaxes horizontales de la Lune , ou la distance de la Lune au centre de la Terre , on pourroit employer des méthodes qui donneroient des angles plus grands que ceux auxquels je réduis la question. Mais tout l'avantage apparent de ces plus grands angles s'évanouit , lorsqu'on considère que quoiqu'on puisse moins les méconnoître par l'observation , ils ne conduiroient à la détermination de la figure de la Terre , qu'autant que ces autres éléments seroient exactement déterminés.

Je crois donc que dans des questions de cette nature , la vraie méthode pour les résoudre , est de les réduire à un


moyen unique, indépendant de toutes les autres circonstances.

Pour cela il faudroit que deux observateurs étant placés sur le même méridien, l'un à l'équateur, l'autre vers le 56^{me}. degré de latitude, (afin que l'un & l'autre vissent la Lune à la même hauteur lorsque sa déclinaison est la plus grande) il y eût un troisième observateur placé sur le même méridien vers le 28^{me}. degré, qui alors vît la Lune à son zénith. On auroit par là deux parallaxes qui auroient pour bases deux arcs du méridien, dont les amplitudes seroient les mêmes, mais dont les longueurs & les cordes étant différentes, soutiendroient à la Lune différents angles. Et quand les observateurs ne seroient pas placés exactement sur le même méridien, la méthode seroit praticable, en observant, comme nous avons déjà dit, le mouvement de la Lune pendant le temps écoulé entre les observations.

Soit le point E sur l'équateur , le point D à la latitude de 36 degrés , & le point T à la latitude de 28 . Soit imaginé le globe $E\Theta\Delta$, sur lequel les points E, Θ, Δ , répondent aux points E, T, D , c'est - à - dire , soient aux mêmes latitudes. Soient tirées dans l'ellipsoïde les perpendiculaires DG, TF ; & dans le globe les rayons $\Delta C, \Theta C$, qui seront parallèles à ces lignes.

Il faut voir maintenant (la Lune étant en L) quelles seront les deux parallaxes observées. Soit appelée P , celle qui a pour base l'arc TD , & p celle qui a pour base l'arc TE . On aura $P = TL\Theta + \Theta L\Delta - \Delta LD$; & $p = EL\Theta - TL\Theta$. Donc la différence des parallaxes , $P - p = TL\Theta - DL\Delta$.

Ou, conservant les mêmes dénominations que dans le § VII , c'est-à-dire, faisant le sinus de la déclinaison de la Lune , ou de la latitude du point T , $= x$, son co-sinus $= y$, le sinus de la latitude du point D , $= s$, son co-sinus



$= c$, on aura pour la différence des parallaxes, $P - p$

$$= \left(\frac{4rrxy - rrsy - ccsy - cssx}{A \cdot CL} \right) \delta.$$

La condition que l'observateur placé entre E & D partage en deux également l'amplitude de l'arc du méridien, & voie la Lune à son zénith, fait qu'on peut chasser x & y de la valeur précédente de la différence des parallaxes ; car on a toujours


$$x = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{rr - rc}; y = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{rr + rc};$$

qui étant substitués, donnent $P - p$

$$= \left[\frac{2s}{r} - \frac{1}{\sqrt{2} \cdot r^4} \times (r r s \sqrt{rr + rc} + ccs \sqrt{rr + rc} + css \sqrt{rr - rc}) \right] \frac{\delta}{CL}.$$

Si maintenant on calcule cette différence des parallaxes, en supposant que l'un des observateurs étant sur l'équateur, l'autre soit sur la latitude de 56 degrés, on trouvera $P - p$

$$= 0,517 \frac{\delta}{CL}.$$



Et supposant que le rayon 1 de la Terre soutend un angle de $57' 20''$ pour la parallaxe horizontale, on trouvera la différence des parallaxes $= 10''$.

On voit par là qu'entre la Terre aplatie de la 178^{me}. partie du diamètre de l'équateur, & la Terre allongée de la 100^{me}., comme à peu près M. Cassini la faisoit, il y auroit une différence de parallaxes de $28''$.


Remarques sur cette méthode.

Quoique ces quantités soient moins grandes que celles que pourroient donner les autres méthodes dont j'ai parlé, elles sont suffisantes pour décider la question de la figure de la Terre, suppose que quelqu'un voulût la regarder encore comme n'étant pas décidée.

Car il est clair que la solution précédente du problème est à l'abri de toutes les erreurs que pourroit causer l'incertitude sur la latitude & sur la réfraction.

Que les observateurs placés en *E* & en *D*, soient précisément sur l'équateur & sur la latitude du 56^{me}. degré, ou à peu près à ces latitudes, il est clair que cela n'apporte aucun changement sensible dans la différence des parallaxes, pourvu que les deux arcs qui les séparent de l'observateur placé en *T*, aient la même amplitude. Or cela est fort facile à déterminer avec plus de précision qu'il n'est nécessaire, sans qu'il soit besoin de connoître les latitudes absolues. Il suffit seulement que l'un & l'autre des observateurs voient à la même distance de leur zénith, la même Etoile qui passe au zénith de l'observateur en *T*.

Et quelque petite erreur commise dans les distances de cette Etoile aux zéniths des observateurs, ou causée parce que la réfraction ne feroit pas précisément la même à la même hauteur en différents lieux, quelque erreur sur ces choses ne causeroit aucune altération sensible dans la différence des



parallaxes. Il n'est pas nécessaire non plus que la Lune passe précisément au zénith de l'observateur en T ; elle peut en être éloignée de quelques minutes, sans que cela change rien à la différence des parallaxes.

Mais si la Lune passe à une distance assez grande du zénith de l'observateur placé en T , pour qu'il en faille tenir compte, il faut faire une correction aux deux parallaxes P & p . Car si la Lune tombe vers l'équateur, comme lorsqu'elle est en l , ayant tiré du point T sur les lignes EL , El , & DL , Dl , les perpendiculaires TY , Ty , & TS , Ts , le sinus de la parallaxe P sera diminué de SH , & celui de la parallaxe p sera augmenté de la même quantité. Or à cause des angles égaux LDl , STs , LEl , YT_y , nommant A l'angle de la distance de la Lune au zénith de l'observateur en T , l'on aura HS , ou $yi = A \times DS$, qui est la quantité qu'il faut retrancher du sinus de la parallaxe P , & ajouter au sinus de la pa-




rallaxe p ; ou qu'il faut retrancher du sinus de la parallaxe p , & ajouter au sinus de la parallaxe P , si la Lune tombe au nord.

Tout se réduit donc à mesurer avec le micrometre les distances de la Lune à quelqu'Etoile. Et tous ceux qui connoissent la justesse avec laquelle on peut faire cette opération , verront que ce seroit ici une maniere indubitable de déterminer la figure de la Terre , si elle n'étoit pas déjà déterminée.


§ XI.

Autre espece de parallaxes.

JE ne parle point d'une autre espece de parallaxes qui auroient pour bases les arcs des cercles paralleles à l'équateur. Il est évident que supposant l'amplitude



l'amplitude de l'arc qui sépareroit les deux observateurs , la même sur le globe que sur la Terre , l'angle qu'ils formeroient à la Lune seroit plus grand sur la Terre que sur le globe ; & il semble qu'on pourroit par là déterminer la figure de la Terre. Mais quand on supposeroit que deux observateurs placés sur l'équateur , ayant déterminé la parallaxe qui auroit pour base l'arc qui les sépare , les deux autres fussent placés sur le parallèle où la valeur de DO est la plus grande , c'est - à - dire , vers le 55^{me} . degré de latitude ; la différence de la parallaxe qu'ils observeroient , à la parallaxe correspondante sur le globe , ne seroit jamais plus grande que l'angle dont le rayon étant la distance de la Lune à la Terre , le sinus seroit $2 DO$, c'est-à-dire , ne pourroit jamais être plus grande que $15''$. Et il faudroit , pour qu'elle atteignît cette grandeur , que les observateurs , tant ceux qui seroient sur l'équateur , que ceux qui seroient sur le parallèle , fussent



séparés de toute la demi-circonférence de leurs cercles.


Cette considération fait que je ne m'arrête pas ici à détailler cette méthode, qui ne dépend que des valeurs de $D\phi$, que j'ai déterminées § V.

§ XII.

Loxodromiques.

J'Omettrois une des principales utilités qu'on peut retirer de la détermination de la figure de la Terre, si je ne donnois ici pour la Terre aplatie la description de la ligne loxodromique, qui est, comme on fait, la ligne qui coupe sous le même angle tous les méridiens de la Terre, & celle que décrit un vaisseau pendant qu'il suit un même rumb. Comme c'est sur cette ligne qu'est fondée toute l'exactitude de la Navigation, la détermination de la figure de la Terre est encore utile ici pour le Navigateur.

Soit $PME \cup P$ une partie du sphéroïde qui représente la Terre, dont P est le pôle, CP le demi-axe, E l'équateur, $m\mu$ un cercle parallèle à l'équateur, PME & $P\mu$ deux méridiens



Ayant tiré des points C, I , & i , infiniment proche du point I , les rayons

$CE, C\epsilon, IM, \& im$; du point M sur le rayon im , ayant abaissé la petite perpendiculaire MK , & tiré du point O les lignes $OM, Om, O\mu$, il est clair que les points N, n, ν , où ces lignes coupent les rayons $CE, C\epsilon$, seront la projection du triangle loxodromique $Mm\mu$, formé sur la surface du sphéroïde, par les petits arcs de la loxodromique, du méridien, & du parallèle à l'équateur.

Faisant donc $CE = r$,

$$OI = x,$$

$$IM = y,$$

$$CN = z,$$

$$Nn = dz,$$

$$E\epsilon = du,$$


$$Mm = ds;$$

On aura $Km = dy$.

$$MK = dx,$$

$$KQ = \frac{ydx}{r},$$

$$Qn = \frac{ydx - zdz}{r}.$$




Puisque la loxodromique coupe tous les méridiens sous le même angle, soit le rapport de 1 à m , celui du rayon à la tangente de cet angle, & l'on aura $m\mu = mds$. Les pyramides semblables $OQ\mu m$, ONn , donnent $Qm; m\mu :: Nn: nv$, c'est-à-dire, $nv = mds$.

: $\frac{x dy - y dx}{x}$. Pour comparer cette quantité aux petits arcs $E s$ de l'équateur, on a $n v = \frac{z du}{r}$; & mettant cette valeur de $n v$ dans l'équation précédente, on a $du = \frac{m r dx}{z} \left(\frac{x ds}{x dy - y dx} \right)$.

On a de plus (faisant $OC = a$) $x \zeta = a y$, & par cette équation & celle qui exprime la nature de la courbe du méridien, on chassera x, y, dx, dy , & ds ; & l'on aura l'équation qui exprime la nature de la projection de la loxodromique.

Si l'on suppose l'œil placé à une distance infinie, il est clair que l'équation générale $du = \frac{m r dx}{z} \left(\frac{x ds}{x dy - y dx} \right)$ devient $du = \frac{m r dx ds}{x dy}$; ou (à cause de $dy = d\zeta$) $du = \frac{m r ds}{z}$ pour la projection orthographique de la loxodromique ;




c'est-à-dire, celle qui est formée par des lignes tirées des points de la loxodromique, perpendiculairement au plan de l'équateur.

§ XIII.

Projection stéréographique de la loxodromique.

SI l'on cherche ainsi la loxodromique tracée sur la surface de la mer, & projetée sur le plan de l'équateur, en supposant l'œil placé au pôle de l'hémisphère opposé; prenant toujours δ pour l'excès dont le rayon de l'équateur CE surpasse le demi-axe CP , l'on aura pour exprimer la nature de la courbe Nv , l'équation $d\psi = \frac{mr dx}{x} - \frac{4mr^3 \delta x dx}{(rr + zx)}$; qui, si la Terre étoit un globe, donneroit la logarithmique spirale pour la projection stéréographique de la loxodromique.



§ XIV.

Projection orthographique de la loxodromique.

On trouvera de même pour la courbe qui est la projection orthogra-


phique de la loxodromique , $du =$

$$\frac{mrrdx}{x\sqrt{(rr-zz)}} - \frac{mszdx}{r\sqrt{(rr-zz)}}.$$

Par le calcul de ces loxodromiques ,
on peut construire des tables & des
cartes plus exactes que celles dont se
servent les Navigateurs.

FIN.

OPÉRATIONS
POUR DÉTERMINER
LA FIGURE DE LA TERRE
ET LES
VARIATIONS DE LA PESANTEUR.





OPÉRATIONS POUR LA MESURE DE LA TERRE.

APRE'S avoir expliqué les utilités qu'on retire de la connoissance de la figure de la Terre, & comment on doit se servir de ses dimensions, tant pour déterminer les vrais lieux de la Lune, que pour connoître la grandeur des degrés de latitude & de longitude, & les points vers lesquels tend la gravité, j'ai cru devoir donner ici l'extrait des opérations que nous avons faites pour la mesure des degrés du méridien, & des différentes quantités de la pesanteur; & y joindre les résultats des autres opérations de la même espèce,

qui ont été faites avec le plus d'exactitude , afin que chacun soit à portée d'en faire l'usage qu'il jugera dans l'application des regles qui se trouvent dans l'ouvrage précédent.

Dans l'année 1736 , je fus envoyé par le Roi vers le pole arctique , avec Mrs. Clairaut , Camus , le Monnier , & M. l'Abbé Outhier , auxquels se joignit M. Celsius Professeur d'Astronomie à Upsal.

Les observations que nous devions faire avoient deux objets ; l'un étoit la mesure d'un arc du méridien , l'autre la mesure de la quantité de la pesanteur. La longueur des degrés vers le pole , comparée à celle des degrés mesurés dans d'autres climats , déterminoit la figure de la Terre ; & la quantité de la pesanteur vers le pole , comparée à celle des autres régions , servoit à faire connoître la gravité primitive.

Nous commençâmes notre mesure de l'arc du méridien à la ville de *Torneå* , qui est située au fond du golfe de Bottnie , à la latitude de $65^{\circ} 50' 50''$, & plus orientale que Paris ,
d'environ

d'environ 1 h 23', & nous prolongeâmes cette mesure par les déserts de la Lapponie, au delà du cercle polaire, jusqu'à une montagne appelée *Kinis*, à la latitude de $66^{\circ} 48' 20''$.

Nos observations sur la pesanteur furent faites à Pello, au pied du mont Kittis.

Nous trouvâmes dans ces régions la pesanteur plus grande qu'elle n'est dans tous les lieux où on l'a jusqu'ici observée, qui sont tous aussi plus éloignés du pôle : elle surpassoit à Pello, de 0,00137, la pesanteur qu'on éprouve à Paris. Et nous trouvâmes le degré du méridien qui coupe le cercle polaire, de 57438 toises, plus grand de 378 que celui qu'on avoit pris pour le degré moyen de la France.

Après notre retour de Lapponie, nous voulûmes vérifier l'amplitude du degré qu'on avoit autrefois mesuré entre Paris & Amiens : nos observations nous donnerent l'amplitude de l'arc compris entre ces deux villes, plus petite que M. Picard ne l'avoit trouvée; & ce degré, de 57183 toises;

plus petit de 255, que celui que nous avons mesuré en Lapponie. Nous conclûmes de tout cela que la Terre étoit un sphéroïde aplati vers les poles.

Nous rendîmes compte à l'Académie de ces opérations; & voici ces opérations mêmes.

Mesure du degré du méridien au cercle polaire.

I.

Angles observés.

Tous les angles suivans ont été observés du centre des signaux que nous avons élevés sur le sommet des montagnes avec un quart-de-cercle de deux pieds de rayon, muni d'un micromètre; & cet instrument vérifié plusieurs fois autour de l'horizon, donnoit toujours la somme des angles fort près de 360°.

Les dixièmes de secondes qu'on trouvera ici, viennent de ce que dans la réduction des parties du microme-

tre en secondes, on a voulu faire le calcul à la rigueur ; & non pas d'une exactitude imaginaire , à laquelle on croiroit être parvenu.

Voici ces angles tels qu'ils ont été observés, avec les hauteurs apparentes des objets observés, où le signe + marque des élévations, & le signe — des abaissements au - dessous de l'horizon.

<i>Angles observés.</i>	<i>angles réduits à l'horizon.</i>	<i>Hauteurs.</i>
-------------------------	--	------------------


Dans la fleche de l'église de Torneâ.

<i>CTK</i> ... 24° 23' 0,"2	24° 22' 58,"8	<i>C</i> . . . 0' 0"
Et par la réduction , pour ce que le centre de l'instrument étoit à 55 pieds du centre de la fleche , dans la direc- tion de Cuitaperi ,		
<i>CTK</i>	24 22 54,5	
<i>KTn</i> ... 19 38 20,9	19 38 20,1	<i>n</i> . . . + 3 0
Et par la réduction pour le lieu du cen- tre, l'instrument placé dans le même endroit,		
<i>KTn</i>	19 38 17,8	<i>K</i> . . . + 8 40 l'horiz. de la mer — 11 0

Sur Niwa.

<i>Tn K</i> .. 87° 44' 24,"8	87° 44' 19,"4	<i>T</i> ... — 17' 40"
<i>Hn K</i> ... 73 58 6,5	73 58 5,7	<i>K</i> ... + 16 50
<i>An K</i> ... 95 29 52,8	95 29 54,4	<i>A</i> ... + 4 40
<i>AnH</i> — <i>AnK</i> — <i>HnK</i>	21 31 48,7	<i>H</i> ... — 0 30
<i>AnH</i> —21 32 16,9	21 32 16,3	
<i>AnH</i> est donc . . .	21 32 2,5	
<i>Cn H</i> ... 31 57 5,2	31 57 3,6	<i>C</i> ... + 10 0

T üj



DU MERIDIEN. 255

<i>Angles observés.</i>	<i>Angles réduits à l'horizon.</i>	<i>Hauteurs.</i>
-------------------------	--	------------------

Sur Kakama.

TKn... 72° 37' 20. ¹⁸	72° 37' 27. ¹⁸	n... — 22' 50"
CKn... 45 50 46, 2	45 50 44, 2	C... — 4 45
HKn... 89 36 0, 4	89 36 2, 4	H... — 5 10
HKC = nKH — CKn	43 45 18, 2	
HKC... 43 45 46, 8	43 45 47, 0	
HKC... 43 45 41, 5	43 45 41, 7	
HKC est donc	43 45 35, 6	
CKT = CKn + nKT	118 28 12, 0	T... — 24 10
HKN... 9 41 48, 1	9 41 47, 7	N... — 8 10

Sur Cuitaperi.

KCn... 28 14 56, 9	28 14 54, 7	K... — 6 10
TCK... 37 9 15, 0	37 9 14, 0	n... — 19 0
HCK... 100 9 56, 4	100 9 56, 8	T... — 24 10
ACH... 30 56 54, 4	30 56 53, 4	H... — 2 40
		A... + 5 0

Sur Avafaxa.

HAP... 53 45 58, 1	53 45 56, 7	P... + 4 50
HAX... 24 19 34, 8	24 19 35, 0	H... — 8 0
xAn... 77 47 46, 7	77 47 49, 5	x... — 10 40
xAC... 88 2 11, 0	88 2 13, 6	C... — 14 15
HAn = HAX + xAn	102 17 24, 5	n... — 20 20
HAC = CAx + xAH	112 23 48, 6	
CAn... 10 13 54, 2	10 13 52, 8	

DU MÉRIDIEN. 297

<i>Angles observés.</i>	<i>angles réduits à l'horizon.</i>	<i>Hauteurs.</i>
-------------------------	--	------------------

Sur Pullingi.

<i>APH...</i> 31° 19' 53,7	31° 19' 55,5	<i>H...</i> — 22' 00"
<i>QPN...</i> 87 52 9,7	87 52 24,3	<i>A...</i> — 18 10
<i>NPH...</i> 37 21 58,9	37 22 2,1	<i>Q...</i> — 32 40
		<i>N...</i> — 26 50

Sur Kittis.

<i>NQP...</i> 40 14 57,3	40 14 52,7	<i>P...</i> + 22 30
		<i>N...</i> + 1 0

Sur Niemi.

<i>PNQ...</i> 51 53 13,7	51 53 4,3	<i>P...</i> + 18 30
<i>PNH...</i> 93 25 8,1	93 25 7,5	<i>Q...</i> — 14 0
<i>HNK...</i> 27 11 55,3	27 11 53,3	<i>H...</i> — 2 40
		<i>K...</i> — 14 0

Sur Horrilakero.

<i>CHn...</i> 19 38 21,8	19 38 21,0	<i>n...</i> — 18 15
<i>CHA...</i> 36 42 4,3	36 42 3,1	<i>A...</i> 0 0
<i>AHP...</i> 94 53 49,7	94 53 49,7	<i>P...</i> + 11 50
<i>PHN...</i> 49 13 11,9	49 13 9,3	<i>N...</i> — 5 0
<i>KHn...</i> 16 26 6,7	16 26 6,3	<i>K...</i> — 12 30
<i>CHK...</i> 36 4 54,1	36 4 54,7	<i>C...</i> — 10 40

Angles pour lier la base Bb avec les sommets d'Avasaxa & de Cuitaperi.

<i>Angles observés.</i>	<i>Angles réduits au même plan.</i>	<i>Hauteurs des objets vus du point B.</i>
<i>ABb.. 9° 21' 58,0</i>	Réduisant <i>ABy</i> ,	
<i>AbB.. 77 31 48,1</i>	<i>yBC</i> , & <i>ABz</i> , <i>zBC</i>	
<i>BAb.. 93 6 7,2</i>	au même plan <i>ABC</i> , & prenant un milieu entre les deux va- leurs de <i>ABC</i> , qu'on a par là.	<i>A + 0° 40' 30"</i>
<i>ABy.. 61 30 5,4</i>		<i>y. + 1 23 30</i>
<i>yBC.. 41 12 3,4</i>		<i>C + 1 4 5</i>
<i>ABz.. 46 7 57,5</i>	<i>ABC. 102° 42' 13,5</i>	<i>z. + 1 11 0</i>
<i>zBC.. 56 34 22,2</i>		
<i>ACB.. 54 40 28,8</i>		
<i>BAC.. 22 37 20,6</i>		

Les lettres *x, y, z*, désignent des objets intermédiaires qui ont servi à prendre en deux fois l'angle *A B C*, qui étoit plus grand que l'amplitude du quart-de-cercle.

I I.

Position des triangles par rapport au méridien.

Pour déterminer la position des triangles avec le méridien, on observa sur Kittis pendant plusieurs jours le passage du Soleil par les verticaux de


Pullingi & de Niemi. On se servoit pour ces observations , d'une lunette de 15 pouces , mobile autour d'un axe horizontal auquel elle est perpendiculaire, & d'une pendule qu'on régloit tous les jours par des hauteurs correspondantes du Soleil.

Ces observations donnerent l'angle que la ligne tirée de Kittis à Pullingi formoit avec le méridien qui passe par Kittis , c'est-à-dire , l'angle $PQM = 28^{\circ} 51' 52''$, & cette position fut confirmée par d'autres observations semblables faites à *Torneå*.

III.

Base mesurée.

La base Bb , qui détermine la grandeur de tous les triangles , fut mesurée deux fois à la perche sur la glace du fleuve ; & par un milieu pris entre les deux mesures qui ne différoient l'une de l'autre que de 4 ^{pouces} , on trouva $Bb = 7406,86$ toises.



IV.

*Calcul des deux triangles par lesquels
commencent toutes les suites.*

A B b.

<i>Angles observés.</i>		<i>Angles corrigés pour le calcul.</i>	
<i>ABb...</i>	9° 21' 58,0	9° 22' 0"
<i>AbB...</i>	77 31 48,1	77 31 50
<i>BAb...</i>	93 6 7,2	93 6 10
<hr/>		<hr/>	
	179 59 53,3		180 0 0

A B C.

<i>ABC...</i>	102 42 13,5	102 42 12
<i>BAC...</i>	22 37 20,6	22 37 20
<i>ACB...</i>	54 40 28,8	54 40 28
<hr/>		<hr/>	
	180 0 2,9		180 0 0

En calculant ces deux triangles d'après la base *Bb*, de 7406,86^{toises}, on trouve la distance *AC*, entre *Avasaxa* & *Cuitaperi*, de 8659,94^{toises}.

Et comme ces deux triangles sont d'une grande justesse, & que leur disposition est très-favorable pour conclure exactement cette distance, on peut regarder *AC* comme la base.

V.

Calcul des triangles de la première suite.

A C H.

Angles observés, réduits à l'horizon. | Angles corrigés pour le calcul.

CAH...	112°	21'	32", 9	. . .	112°	21'	17"
ACH...	30	56	53, 4	. . .	30	56	47
AHC...	36	42	3, 1	. . .	36	41	56
<hr/>				<hr/>			
	180	0	29, 4		180	0	0

C H K.

CHK...	36	4	54, 7	. . .	36	4	46
CKH...	43	45	35, 6	. . .	43	45	26
KCH...	100	9	56, 8	. . .	100	9	48
<hr/>				<hr/>			
	180	0	27, 1		180	0	0

C K T.

KCT...	37	9	12, 0	. . .	37	9	7
CKT...	118	28	12, 0	. . .	118	28	3
CTK...	24	22	54, 3	. . .	24	22	50
<hr/>				<hr/>			
	180	0	18, 3		180	0	0

A H P.


AHP...	94	53	49, 7	. . .	94	53	56
HAP...	53	45	56, 7	. . .	53	46	3
APH...	31	19	55, 5	. . .	31	20	1
<hr/>				<hr/>			
	179	59	41, 9		180	0	0

H N P.

HNP...	93	25	7, 5	. . .	93	25	1
NHP...	49	13	9, 3	. . .	49	13	3
HPN...	37	22	2, 1	. . .	37	21	56
<hr/>				<hr/>			
	180	0	18, 9		180	0	0

N P Q.

NPQ...	87	52	24, 3	. . .	87	52	17
NQP...	40	14	52, 7	. . .	40	14	46
PNQ...	51	53	4, 3	. . .	51	52	57
<hr/>				<hr/>			
	180	0	21, 3		180	0	0



Prenant $AC = 8659,94^{\text{toises}}$, tel qu'on l'a trouvé par les deux triangles ABb , ABC , on trouve par la résolution des triangles précédents,

$$\begin{aligned} AP &= 14277,43^{\text{toises}} \\ PQ &= 10676,9 \\ CT &= 24302,64 \end{aligned}$$


Ces lignes forment avec la méridienne les angles suivans,

$$\begin{aligned} PQD &= 61^{\circ} 8' 8'' \\ APE &= 84 \quad 33 \quad 54 \\ ACF &= 81 \quad 33 \quad 26 \\ CTG &= 69 \quad 49 \quad 8 \end{aligned}$$

Et la résolution des triangles rectangles DQP , APE , ACF , CTG , donne pour les parties de la méridienne,

$$\begin{aligned} PD &= 9350,45^{\text{toises}} \\ AE &= 14213,24 \\ AF &= 8566,08 \\ CG &= 22810,62 \\ \hline QM &= 54940,39 \end{aligned}$$

pour l'arc du méridien qui passe par Kittis, & qui est terminé par la perpendiculaire tirée de *Torneâ*.



VI.

Calcul des triangles de la seconde suite.

ACH.

<i>Angles observés, réduits à l'horizon.</i>				<i>Angles corrigés pour le calcul.</i>			
<i>ACH...</i>	30°	56'	53",4	30°	56'	47"
<i>CAH...</i>	112	21	32,9	112	21	17
<i>AHC...</i>	36	42	3,1	36	41	56
<hr/>				<hr/>			
	180	0	29,4		180	0	0

CHK.

<i>CHK...</i>	36	4	54,7	36	4	46
<i>CKH...</i>	43	45	35,6	43	45	26
<i>KCH...</i>	100	9	56,8	100	9	48
<hr/>				<hr/>			
	180	0	27,1		180	0	0

CKT.

<i>CKT...</i>	118	28	12,0	118	28	3
<i>CTK...</i>	24	22	54,3	24	22	50
<i>KCT...</i>	37	9	12,0	37	9	7
<hr/>				<hr/>			
	180	0	18,3		180	0	0

HKH.

<i>HKH...</i>	9	41	47,7	9	41	50
<i>HNH...</i>	27	11	53,3	27	11	56
<i>KHN...</i>	143	6	3,2	143	6	14
<hr/>				<hr/>			
	179	59	44,2		180	0	0

HNP.

<i>HNP...</i>	93	25	7,5	93	25	1
<i>HPN...</i>	37	22	2,1	37	21	56
<i>NHP...</i>	49	13	9,3	49	13	3
<hr/>				<hr/>			
	180	0	18,9		180	0	0

NPQ.

<i>NPQ...</i>	87	52	24,3	87	52	17
<i>NQP...</i>	40	14	52,7	40	14	46
<i>PNQ...</i>	51	53	4,3	51	52	57
<hr/>				<hr/>			
	180	0	21,3		180	0	0

DU MÉRIDIEN. 381

Se servant toujours de

$$AC = 8652,94 \text{ toises.}$$

on a par la résolution des triangles précédents,

$$QN = 13564,64 \text{ toises.}$$

$$NK = 25053,25$$

$$KT = 16695,84$$

Ces lignes forment avec la méridienne, les angles suivants,

$$NQd = 78^\circ 37' 6''$$

$$KNL = 86 \quad 7 \quad 12$$

$$KTg = 85 \quad 48 \quad 7$$

La résolution des triangles QNd , KNL , KTg , donne pour les parties de la méridienne,

$$Nd = 13297,88 \text{ toises.}$$


$$KL = 24995,83$$

$$Kg = 16651,05$$

$$QM = 54944,76$$

L'autre suite donnoit $QM = 54940,39$

On a donc pris ... $QM = 54942,57$.



VII.

*Examen de la position des triangles
par rapport au méridien.*


A *Torneâ* l'on chercha de nouveau la position des triangles avec le méridien. Ce fut en observant l'angle que formoit avec le signal de Niwa, le Soleil dans l'horizon, & l'heure à laquelle cela arrivoit ; & comme on trouva par plusieurs observations, que l'angle que formoit la ligne *TK*, avec le méridien de *Torneâ*, ne différoit que de $34''$ de celui qui résultoit de la suite des triangles depuis Kittis, on s'en tint à la position déterminée sur Kittis.

VIII.

*Examen de l'arc du méridien qu'on
trouveroit par d'autres suites de
triangles.*

Comme dans la figure *TCAPQNK*, il y a plus de triangles qu'il n'est nécessaire pour déterminer la distance

314. MESURE DU DEGRE



de *M* à *Q*, nous allons voir quelles différences produiroient sur cette distance, différentes suites de triangles, même en y employant des suites vicieuses par la petitesse de quelques-uns de leurs angles; d'où l'on peut conclure les limites des erreurs de notre mesure. Voici donc le calcul de dix suites nouvelles.

I.

Par les triangles *TnK*, *nKC*, *CKH*, *HCA*, *AHP*, *PHN*, *NPQ*.

Partant toujours du côté *AC*, la résolution de ces triangles donne pour la distance *QM* 54941 toises.

Qui diffère de la distance conclue par nos deux premières suites, de . . . 1 $\frac{1}{2}$.

II.


Par les triangles *TnK*, *KHn*, *nCH*, *HCA*, *APH*, *HNP*, *PNQ*, on a *QM* . . 54936

Qui diffère de 6 $\frac{1}{2}$.

III.

Par les triangles *TnK*, *KnH*, *HnA*, *ACH*, *HAP*, *PHN*, *NPQ*, on a *QM* . . 54942 $\frac{1}{2}$

Qui ne diffère pas sensiblement.



IV.

Par les triangles TnK , KCH , HnC , CHA ,
 AHP , PHN , NPQ , on a QM .. 54943 $\frac{1}{2}$ toises.
 Qui differe de 1.

V.

Par les triangles TnK , KnC , CnA , ACH ,
 HAP , PHN , NPQ , on a QM .. 54925
 Qui differe de 17 $\frac{1}{2}$.

VI.

Par les triangles TnK , KnH , HAn , nCA ,
 AHP , PHN , NPQ , on a QM .. 54915 $\frac{1}{2}$
 Qui differe de 27.

VII.

Par les triangles TnK , KnC , CAn , nHK ,
 KHN , NHP , PNQ , on a QM .. 54912
 Qui differe de 30 $\frac{1}{2}$.

VIII.

Par les triangles TnK , KCn , nAC , CKH ,
 HKN , NHP , PNQ , on a QM .. 54906 $\frac{1}{2}$
 Qui differe de 36.


IX.

Par les triangles TnC , CnA , AnH , HAP ,
 PHN , NPQ , on a QM .. 54910
 Qui differe de 32 $\frac{1}{2}$.

X.

Par les triangles TnC , CAn , nCK , KnH ,
 HKN , NHP , PNQ , on a QM .. 54891
 Qui differe de 51 $\frac{1}{2}$.

Quoiqu'il ne se trouve pas entre toutes
 ces suites des différences bien considérables,
 nous n'avons pas cru les devoir faire entrer




dans la détermination de la longueur de notre arc , que nous avons faite sur deux suites qui nous ont paru préférables aux autres.

I X.

Examen des angles horizontaux par leur somme dans le contour de l'heptagone.

CTK	24°	22'	54,5
KCT	37	9	12,0
KCH	100	9	56,8
HCA	30	56	53,4
CAH	112	21	48,6
HAP	53	45	56,7
APH	31	19	55,5
HPN	37	22	2,1
NPQ	87	52	24,3
PQN	40	14	52,7
QNP	51	53	4,3
PNH	93	25	7,5
HNK	27	11	53,3
NKH	9	41	47,7
HKC	43	45	35,6
CKT	118	28	12,0

Somme 900° 1' 37", qui diffère de 1' 37" de ce qu'elle devoit être si la surface étoit plate, & s'il n'y avoit aucune erreur dans les observations ; mais qui doit être réellement un peu plus grande que 900 degrés , à cause de la courbure de la Terre.



X.

Longueur de l'arc du méridien.

Les lieux où nous observâmes les Etoiles qui devoient servir à déterminer l'amplitude de l'arc du méridien compris entre Kittis & *Torneâ*, étoient, l'un plus septentrional que le point *Q*, de 3^{toises} 4^{pieds} 8^{pouces}, l'autre plus méridional que le point *T*, de 73^{toises} 4^{pieds} 5¹/₂^{pouces}; ajoutant donc 77, 5²/₂^{toises} à *QM* = 54942, 57^{toises}, & encore 3, 3⁸/₈^{toises}, parce que les points *T* & *Q* ne sont pas dans la même ligne méridienne, on a l'arc dont nous avons déterminé l'amplitude, = 55023, 47^{toises}.

XI.

Amplitude de l'arc du méridien.

Pour déterminer l'amplitude de l'arc dont nous avons mesuré la longueur, nous nous servîmes d'un instrument singulier par sa construction & par son excellence: il avoit été fait à Londres sous les yeux du fameux M. Graham,

qui en avoit lui-même divisé le limbe, qui n'est que de $5\frac{1}{2}$ degrés : le rayon de ce limbe est une lunette de 9 pieds, suspendue comme un pendule, & que la pointe d'un micrometre excellent, fixé contre un limbe immobile, fait mouvoir autour de son centre, pendant qu'une aiguille marque sur un cadran la quantité de ce mouvement. Nous vérifiâmes la division de cet instrument au microscope qui y est adapté, & nous la trouvâmes d'une exactitude qu'on auroit eu de la peine à croire. Enfin l'instrument est tel, que rarement la différence qui se trouve entre une observation & l'autre monte à 2 ou 3".

Avec cet instrument nous déterminâmes l'amplitude de l'arc du méridien deux fois ; sur deux arcs différents du limbe ; par deux différentes Etoiles ; & dans deux différentes saisons.

La premiere amplitude fut déterminée par l'Etoile δ du *Dragon*, observée au nord sur Kittis, les 4, 5, 6, 8, & 10 Octob. 1736, & à *Torneå*

les 1 , 2 , 3 , 4 , & 5 Nov. de la même année. Elle fut trouvée de $57' 25''$, 55 : & corrigée pour la précession des équinoxes , & pour l'aberration de la lumière , elle se réduisit à $57' 26''$, 9.

La seconde amplitude fut déterminée par l'Etoile α du *Dragon* observée au midi à *Torneå* les 17 , 18 , 19 Mars 1737 , & sur Kittis les 4 , 5 , 6 Avril de la même année. Elle se trouva de $57' 25''$, 85 : & corrigée comme l'autre , elle se réduisit à $57' 30''$, 4.

Quoique ces deux amplitudes approchassent extrêmement l'une de l'autre , par l'examen que nous fîmes des deux arcs du secteur sur lesquels on les avoit déterminées , nous connûmes qu'elles approchoient encore davantage , & au delà de ce que nous pouvions espérer. Car nous trouvâmes le premier de ces arcs plus grand que le second de 0 , 95''. Nous conclûmes donc par un milieu l'amplitude de l'arc du méridien intercepté entre les parallèles qui passent par Kittis & *Torneå* de $57' 28''$, 7.

X I I.

Degré du méridien.

Comparant cette amplitude à la longueur de l'arc de 55023, 47 toises , *le degré du méridien qui coupe le cercle polaire , est de 57438 toises.*

Voilà quelles sont les opérations que nous avons faites au cercle polaire. Il faut maintenant faire connoître les autres opérations de même genre qui ont été faites dans les autres climats.

AUTRES MESURES.

ON avoit fait en différents temps , & dès les temps les plus reculés , des opérations pour déterminer la grandeur de la Terre , par la mesure de quelque degré du méridien ; (car dans ces temps - là , on n'imaginoit pas que la Terre pût avoir une autre figure que celle d'une sphere) & la mesure d'un seul de ses degrés déterminoit

sa circonférence & son diamètre. Mais sans nous arrêter à ces premières mesures , toutes défectueuses par les instruments ou les méthodes dont on s'étoit servi , ou du moins fort douteuses par l'incertitude sur la grandeur des mesures par lesquelles les Auteurs les ont évaluées , je ne citerai ici de ces opérations que celles dans lesquelles il paroît quelque exactitude.

Mesure de M. Norwood.

En 1633 & 1635 , M. Norwood déterminâ l'amplitude de l'arc du méridien intercepté entre *Londres* & *York* , en observant les hauteurs du Soleil au solstice d'été , & trouva cette amplitude de $2^{\circ} 28'$.

Il mesura ensuite avec des chaînes la distance entre ces deux villes, observant les angles de détours , les hauteurs des collines , & les descentes ; & réduisant le tout à l'arc du méridien , il trouva 9149 chaînes pour la longueur de cet arc , qui , comparée à l'amplitude , donnoit le degré de $37^{\circ} 9'$

326 MESURE DU DEGRÉ

chaînes 5 pieds , ou de 367196 pieds anglois , qui font 57300 de nos toises *.

Mesure de M. Picard.

En 1670 , M. Picard mesura par des triangles l'arc du méridien compris entre les paralleles de *Malvoisine* & d'*Amiens* , & déterminant la longueur de cet arc par deux bases mesurées à la perche vers les deux extrémités , il le trouva de 78850 toises. Il détermina ensuite l'amplitude de cet arc par les observations de l'Etoile du genou de *Cassiopée* : & ayant trouvé cette amplitude de $1^{\circ} 22' 55''$, il en conclut le degré de 57060 toises. †

Mesure de M. Cassini.

En 1718 , M. Cassini donna le résultat de toutes les opérations que , tant lui , que M. Dominique Cassini

* *The Seaman's practice by Richard Norwood.*

† *Mesure de la Terre , par M. l'Abbé Picard.*

son pere , avoient faites pour déterminer la longueur des degrés.

Ils avoient partagé le méridien de la France en deux arcs qu'ils avoient mesurés séparément ; l'un de *Paris* à *Collioure* , dont la longueur étoit de 360614 toises ; & l'amplitude , de $6^{\circ} 18' 57''$, déterminée par l'Etoile de *la Chevre* , leur avoit donné le degré de 57097 tois.

L'autre de *Paris* à *Dunkerque* , dont la longueur étoit de 125454 toises , & l'amplitude de $2^{\circ} 12' 9'' 30'''$, déterminée par l'Etoile γ du *Dragon* , leur avoit donné le degré de 56960 toises.

Enfin la mesure de l'arc entier terminé par les paralleles qui passent par *Collioure* & *Dunkerque* , dont la longueur étoit de 486156 toises , & l'amplitude de $8^{\circ} 31' 11'' \frac{1}{2}$, leur donnoit le degré moyen de cet arc , de 57061 toises , presque égal à celui de M. Picard.

C'étoit cette différence entre les degrés mesurés vers le nord , qu'ils trouverent plus petits que ceux qu'ils avoient mesurés vers le midi , qui leur

fit conclure que la Terre avoit une figure toute opposée à celle que nos observations lui donnent , & étoit un ellipsoïde allongé vers les poles , dont l'axe surpassoit le diametre de l'équateur , d'environ $\frac{1}{100}$. *

Mesure de M. Musschenbroek.

Snellius avoit autrefois donné une mesure du degré fort défectueuse : M. Musschenbroek ayant corrigé cette mesure , tant par ses propres observations , que par celles de Snellius même , a trouvé le degré entre *Alcmaar* & *Berg-op-Zoom* , de 57033 de nos toises. †

CORRECTION DE LA MESURE
de M. Picard.

A Près notre retour de Lapponie , nous flattant d'avoir un instrument fort

* *Traité de la grand. & fig. de la Terre , de M. Cassini.*

† *Musschenbroek , Dissert. de magnit. Terra.*

supérieur à celui avec lequel M. Picard avoit déterminé l'amplitude de son arc ; nous fiant d'ailleurs à ses triangles, & pensant que pour la comparaison des degrés du méridien mesurés en différents lieux, il étoit fort important que l'amplitude de ces degrés fût déterminée avec un même instrument , nous voulûmes déterminer l'amplitude du degré entre *Paris* & *Amiens* , avec le même secteur dont nous nous étions servis au cercle polaire.

Pour cela , nous prîmes sur l'arc mesuré par M. Picard , la partie terminée par les deux églises de Notre-Dame d'*Amiens* & de Notre-Dame de *Paris*.

Il seroit difficile dans toute l'Europe de trouver un arc du méridien terminé par deux monuments plus beaux & plus durables que les deux églises qui terminent celui-ci : & ces deux monuments , que le hazard a placés si exactement sur le même méridien , qu'ils ne different en longitude que d'un arc de 3' , dont l'église de

Paris est plus orientale que celle d'*Amiens*, paroissoient destinés à être les termes d'une telle mesure. Nous prîmes la distance entre ces deux églises, telle que M. Picard l'a donnée, de 59530 toises.

Nous cherchâmes ensuite par deux Etoiles différentes, quelle étoit l'amplitude qui répondoit à l'arc terminé par ces deux monuments. L'une de ces Etoiles étoit α de *Perfée*; l'autre fut γ du *Dragon*: & après plusieurs observations de ces deux Etoiles, qui s'accordoient fort entr'elles, & auxquelles nous fîmes les corrections nécessaires pour la précession des équinoxes & pour l'aberration, nous trouvâmes pour l'amplitude de l'arc, $1^{\circ} 2' 28''$; d'où nous conclûmes, en conservant la mesure geodesique de M. Picard, que le degré du méridien entre *Paris* & *Amiens* étoit de 57183 toises. *

* Degré du méridien entre *Paris* & *Amiens*.

FIGURE DE LA TERRE.

P Renant la figure de la Terre pour celle d'un ellipsoïde , ce degré de 57183 toises , dont le milieu répond à la latitude de $49^{\circ} 22'$, comparé à celui de 57438 , que nous avons mesuré à la latitude de $66^{\circ} 20'$, donne à la Terre la figure d'un sphéroïde aplati , dont le diamètre de l'équateur surpasse l'axe d'environ $\frac{1}{178}$.



A D D I T I O N.

DEpuis la premiere édition de cet ouvrage , nous avons eu la satisfaction de voir revenir du Pérou les Académiciens qui y avoient été envoyés ; & de les voir en rapporter une mesure très-exacte du premier degré de latitude , du degré du méridien coupé par l'équateur. Ce degré tiré de l'arc entre *Quito* & *Cuenca* , dont la longueur est de 176950 toises , & l'amplitude de $3^{\circ} 7' 1''$, étant réduit au niveau de la mer , se trouve de 56750 toises. *

La France , dont la magnificence pour le progrès des Sciences est sans bornes , ayant envoyé M. l'Abbé de la Caille au cap de Bonne-Espérance pour faire des observations astronomiques , cet illustre Académicien nous en a rapporté une nouvelle mesure du degré , qui ne doit céder à aucune. Elle est

** V. Mesure des trois premiers degrés du méridien , art. XXIV. II. partie , par M. de la Condamine.*

tirée de l'arc du méridien entre le cap & Klipfonteyn , dont la longueur est de 69669 toises , & l'amplitude de $1^{\circ} 13' 17''$: & le degré du méridien à la latitude de $33^{\circ} 18'$ dans l'hémisphère austral de 57037 toises. *

Les figures de la Terre qui résultent de ces nouvelles opérations s'éloignent si peu de celle que nous avons ci-dessus déterminée , qu'on pourroit plutôt s'étonner de leur accord qu'en exiger un plus grand.

Nous avons conclu le rapport de l'axe de la Terre au diamètre de l'équateur de 177 à 178.

Le degré du Pérou comparé au nôtre donne pour ce rapport 215 à 216.

Le degré du cap de Bonne-Espérance donneroit 240 à 241.

Ces deux derniers degrés ; celui du Pérou & celui du cap de Bonne-Espérance , comparés ensemble , donnent 181 à 182.

De petites erreurs telles que celles qui sont nécessairement commissibles

* Extrait d'une lettre que M. l'Abbé de la Caille m'a écrite.

dans ces opérations , étant admises , toutes ces mesures , excepté celle qui a été faite en France , donneroient à la Terre une même figure.

Mais il faut observer que dans l'évaluation du degré de Lapponie , quoique nous ayons regardé la réfraction comme nulle pour des Etoiles si proches du zénith , les autres Astronomes dans l'évaluation de leur degré en ayant tenu compte , il faut en tenir compte aussi dans l'évaluation du nôtre , qui par là sera diminué de 16 toises , pour le comparer avec les autres.

M. Euler ayant fait de toutes les mesures un examen équitable , & supposant sur chacune les moindres erreurs nécessaires pour les concilier , a trouvé :

Que sur le degré au cercle polaire , il suffisoit de supposer une erreur de 27 toises.

Sur le degré du cap de Bonne-Espérance une erreur de 43.

Sur le degré du Pérou une de 15.
Mais que sur celle de la France , telle

qu'elle est donnée dans la dernière mesure du méridien , il faudroit admettre une erreur de 125 toises.

La juste longueur des degrés seroit alors

Au Pérou à la latitude $0^{\circ} 30'$
..... de 56768 toises.

Au cap de Bon. Espérance à la lat. $33^{\circ} 18'$
..... de 56994 toises.

En France à la latitude $49^{\circ} 23'$
..... de 57199 toises.

En Lapponie à la latitude ... $66^{\circ} 20'$
..... de 57395 toises. *

Le rapport de l'axe au diamètre de l'équateur seroit celui de 229 à 230 : & la Terre se trouveroit avoir précisément la figure que Newton lui avoit donnée ; quoiqu'il fit la Terre un peu plus petite , étant parti d'un degré plus petit. Et il ne paroît pas que la Terre puisse de beaucoup s'écarter de cette figure.

* Mém. de l'Acad. R. des Sciences de Berlin, tome IX.

EXPÉRIENCES POUR LES VARIATIONS DE LA PESANTEUR.

MESURE DE LA PESANTEUR dans la zone glacée.

L'INSTRUMENT dont nous nous servîmes pour connoître le rapport de la pesanteur à *Paris*, à la pesanteur à *Pello*, est une pendule d'une construction particulière, de l'invention de M. Graham, qui est destinée pour ces sortes d'expériences.

Le pendule est une pesante lentille qui tient à une verge plate de cuivre : cette verge est terminée en enhaut par une pièce d'acier qui lui est perpendiculaire, & dont les extrémités sont deux couteaux qui portent sur deux tablettes planes d'acier, situées
toutes

toutes deux dans le même plan horizontal. On est assuré de la situation de ce plan , lorsqu'une pointe qui fait l'extrémité de la verge du pendule , répond au milieu d'un limbe dans le plan duquel elle doit se trouver ; & ce limbe sert à mesurer les arcs que décrit le pendule.

Tout l'instrument est renfermé dans une boîte très - solide ; & lorsqu'on le transporte , on élève le pendule avec une vis , par le moyen d'un châssis mobile , de manière que le tranchant des couteaux ne porte plus sur rien , & est tout en l'air , quoique la pièce d'acier qui forme les couteaux se trouve alors appuyée au défaut de leur tranchant. On a attaché au dedans de la boîte une pièce de bois creusée pour recevoir la lentille ; & cette pièce , après que la lentille y a été mise , est recouverte d'une autre qui s'y applique avec des vis , de manière que ni la lentille ni la verge ne peuvent avoir aucun mouvement ; la seule liberté qu'ait la verge du pendule , c'est de s'allonger ou de s'accourcir selon le

chaud ou le froid , rien ne la gêne à cet égard. Enfin on a attaché au dedans de la boîte un thermometre par le moyen duquel on peut connoître quel retardement tel & tel degré de chaleur cause au pendule , & en tenir compte dans les observations ; ou bien par lequel on peut (comme nous avons fait) s'assurer que l'instrument est exposé à la même température dans les différents lieux où se font les observations.

Avec le poids ordinaire , le pendule décrivait des arcs de $4^{\circ} 20'$; avec la moitié de ce poids , il décrivait des arcs de $3^{\circ} 0'$: & ces grandes différences dans les poids & dans les arcs , ne faisoient dans la marche du pendule qu'une différence de $3''$ ou $4''$ par jour , dont il alloit plus vite en décrivant les petits arcs.

On voit par là combien cet instrument est peu sensible aux différences dans les poids & dans les arcs : & combien on peut compter que son accélération d'un lieu dans un autre ne vient que de l'augmentation de la

pesanteur, ou du froid qui raccourcit la verge du pendule.

Ayant tenu cet instrument à *Pello* ; & ensuite à *Paris* , précisément au même degré de chaleur ; & les oscillations ayant été à fort peu près les mêmes , nous observâmes à *Pello* par les passages de l'Etoile *Regulus* au fil vertical d'une lunette fixe , & à *Paris* par les passages de l'Etoile *Sirius* , que le pendule retardoit de *Pello* à *Paris* de 59'' pendant chaque révolution des Etoiles fixes.

Nous conclûmes delà que la pesanteur à *Paris* est à la pesanteur à *Pello* , comme 100000 à 100137.

Le même instrument avoit été éprouvé par M. Graham à *Londres* ; avant que de nous être envoyé ; & ayant été tenu à *Londres* & à *Paris* à une même température , & y ayant fait les mêmes oscillations , il avoit retardé de *Londres* à *Paris* de 7'', 7 pendant chaque révolution des Etoiles fixes ; d'où nous conclûmes que la pesanteur à *Paris* est à la pesanteur à *Londres* , comme 100000 à 100018.

AUTRES EXPÉRIENCES

pour la mesure de la pesanteur.

M. Richer est celui à qui l'on doit cette fameuse découverte de la diminution de la pesanteur vers l'équateur. Ayant remarqué ce phénomène à *Cayenne* en 1672, par le retardement de son horloge, il trouva que la longueur du pendule à secondes dans cette île, étoit plus courte de 1 ligne $\frac{1}{4}$ qu'à *Paris*, où elle est selon sa mesure, de 36 pouces 8 lignes $\frac{2}{3}$.

ou de 440 $\frac{1}{2}$ a

A *Paris*, Mrs. Varin, Deshayes, & de Glos, ont trouvé la longueur du pendule à secondes, de 440 $\frac{1}{2}$. b

M. Godin, de 440 $\frac{1}{2}$. c

M. de Mairan, par un grand nombre d'expériences faites avec grand soin, la trouva de 440 $\frac{17}{30}$. d

M. Picard la trouva de 440 $\frac{1}{2}$. e
& la trouva la même dans l'isle de Huene, à Lyon, à Bayonne & à Sete.

a Anciens Mém. de l'Acad. tome VII. b Ibidem.

c Mém. de l'Acad. 1735. d Ibidem.

e Anciens Mém. de l'Acad. tome VII.

Toutes ces mesures du pendule à secondes à *Paris*, différent si peu les unes des autres, qu'on peut plutôt s'étonner de cette exactitude, qu'espérer de parvenir à une exactitude plus grande.

A *Archangel*, à la latitude de $64^{\circ} 34'$, M. de la Croyere a trouvé la longueur du pendule, de 440 $\frac{13}{20}$.^a
en la supposant à *Paris* de 440 $\frac{1}{2}$.

Au *Caire* en Egypte, à $30^{\circ} 2'$ de latit.
M. de Chazelles l'a trouvée de . . . 440 $\frac{1}{4}$.^b

Au *Cap* dans l'isle de St. Domingue, à $19^{\circ} 48'$ de latitude, M. Deshayes l'a trouvée de 439.^c

Au *Petit-Goave* dans l'isle de St. Domingue, à $18^{\circ} 27'$ de latitude, M. Godin l'a trouvée de 439 $\frac{3}{8}$.^d
M. Bouguer, de 439 $\frac{1}{3}$.
M. de la Condamine, de 439 $\frac{7}{30}$.

A *Blackriver* dans la Jamaïque, à 18° de latitude, M. Campbell, avec un instrument semblable au nôtre,

a *Acad. Petrop. Comment. tom. IV.*

b *Transact. philos. traduites par M. de Bremond.*

c *Mém. de l'Acad. 1701.*

d *Mém. de l'Acad. 1735.*

a trouvé que le pendule transporté de *Londres* retardoit de 1' 58'' pendant chaque révolution des Etoiles fixes. ^a

Dans l'île de *St. Christophe*, à 17° 19' de latitude, M. Deshayes l'a trouvée de. . . 438 $\frac{1}{4}$. ^b

A la *Guadeloupe*, à 16° de latit. Mrs. Varin, Deshayes & de Glos, de. . . 438 $\frac{1}{2}$. ^c

A *St. Pierre* dans la Martinique, à 14° 44' de latitude, M. Deshayes la trouva de 438 $\frac{1}{2}$. ^d

A *Gorée*, à 14° 40' de latitude, Mrs. Varin, Deshayes & de Glos, de 438 $\frac{1}{9}$. ^e

A *Porto-Belo*, à 9° 33' de latitude, M. Godin, de 439 $\frac{2}{49}$. ^f

M. Bouguer, de 439 $\frac{7}{90}$.

A *Panama*, à 8° 35' de latitude, Mrs. Godin, Bouguer, & de la Condamine, de 439 $\frac{1}{5}$. ^g

A *Cayenne*, à 4° 56' de latitude, M. Deshayes l'a trouvée d'un peu moins que 438 $\frac{1}{2}$. ^h

a *Transact. philos. traduites par M. de Bremond.*

b *Mém. de l'Acad. 1701.*

c *Anciens Mém. de l'Acad. tome VII.*

d *Mém. de l'Acad. 1701.*

e *Anciens Mém. de l'Acad. tome VII.*

f *Transact. philos. traduites par M. de Bremond.*

g *Ibidem.*

h *Mém. de l'Acad. 1701.*

A *Punta-Palmar*, à 2' de latitude

méridionale, M. de la Condamine, de 438,96.^a Lignes.

A *Riojama*, à 9' de latitude mérid.

M. Bouguer, de 438,82.^b

M. de la Condamine, de 438,93.

A *Quito*, à 25' de latitude mérid.

M. Bouguer, de 438,82.^c

M. de la Condamine, de 438,84.

Au *Cap de Bon. Espérance* à 33° 18'

de latitude méridionale, M. l'Abbé

de la Caille de 440,07.

Comme ces expériences ont été faites par différentes méthodes, les uns ayant cherché les rapports de la pesanteur par les longueurs du pendule isochrone dans les différents lieux, les autres par l'accélération ou le retardement d'un pendule invariable, transporté dans des lieux différents; pour réduire ces expériences à leur objet, j'ai formé la table suivante des différents poids d'une même quantité de matière, dans les lieux où les expériences ont été faites; observant dans

a *Transact. philos. traduites par M. de Bremond.*

b *Ibidem.* c *Ibidem.*

la construction de cette table , de ne déterminer ces poids que par les expériences qui ont été faites en différents lieux par les mêmes observateurs , ou avec les mêmes instruments ; parce que les mêmes instruments & la même manière de s'en servir rendent plus sûre la comparaison des expériences. Enfin j'ai négligé totalement quelques expériences qu'on trouve dans la carte que M. de Bremond a insérée dans la traduction des Transactions philosophiques de l'année 1734 , parce que ces expériences s'écartoient tant des autres , ou étoient si indécises dans les Auteurs qui les ont rapportées , qu'elles m'ont paru justement suspectes.



DE LA PESANTEUR. 345

*T*ABLE des différents poids d'une même quantité
de matière dans différents lieux de la Terre.

NOMS DES LIEUX.	LATI- TUDE.	POIDS.	OBSERVATEURS.
<i>A Pello.....</i>	66° 48'	100137	{ Mrs. Clairaut , Camus, le Mon- nier, & moi.
<i>A Londres...</i>	51 31	100018	
<i>A Paris.....</i>	48 50	100000	Tous les Observateurs.
<i>A saint Domingue.</i>	19 48	99647	M. Deshayes.
<i>A saint Domingue.</i>	18 27	99732	M. Godin.
<i>A la Jamaïque.</i>	18 0	99744	M. Campbell.
<i>A saint Christophe.</i>	17 19	99590	M. Deshayes.
<i>A la Guadeloupe.</i>	16 0	99533	{ Mrs. Varin , Deshayes, & de Glos.
<i>A la Martinique.</i>	14 44	99533	
<i>A Gorée.....</i>	14 40	99546	{ Mrs. Varin , Deshayes, & de Glos.
<i>A Porto-Belo</i>	9 33	99665	
<i>A Cayenne.</i>	4 56	99716	M. Richer.
	moins que	99533	M. Deshayes.

DÉCLINAISON

De l'aiguille aimantée à Torneå.

Nous avons observé la déclinaison de l'aiguille aimantée avec une boussole de cuivre d'environ 10 pouces de diamètre, en regardant à travers les pinnules de son alidade un objet placé dans la méridienne d'un petit observatoire bâti sur le fleuve ; & prenant le milieu de ce que donnoient les observations faites avec quatre aiguilles différentes, nous avons trouvé que la déclinaison de l'aiguille aimantée étoit à *Torneå* en 1737, de $5^{\circ} 5'$ du nord à l'ouest.

Bilberg l'avoit trouvée en 1695 de 7° du même côté : mais ne la donne qu'avec peu de confiance, *

* *Refraçtio Solis inoccidui in septentrion. oris.*

FIN DU IV. ET DERNIER TOME.

APPROBATION.

J' Ai lu par ordre de Monseigneur le Chancelier cette nouvelle édition des OUVRES DE M. DE MAUPERTUIS, & je n'y ai rien trouvé qui doive en empêcher l'impression. A Paris , le 6. Septembre 1755.

TRUBLET.

PRIVILEGE GENERAL.

L OUIS PAR LA GRACE DE DIEU ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE : A nos amés & féaux Conseillers les gens tenant nos Cours de Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel , grand Conseil , Prévôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenants civils , & autres nos Justiciers qu'il appartiendra , SALUT. Notre bien amé le Sieur DE MAUPERTUIS Nous a fait exposer qu'il desireroit faire imprimer & donner au Public les Œuvres de sa composition , s'il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilège pour ce nécessaires. A CES CAUSES , voulant favorablement traiter l'Exposant , Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes de faire imprimer sésdits Ouvrages autant de fois que bon lui semblera , & de les faire vendre & débiter par tout notre royaume pendant le temps de deux années consécutives , à compter du jour de la date des Présentes. FAISONS DÉFENSES à tous Imprimeurs , Libraires , & autres personnes , de quelque qualité & condition qu'elles soient , d'en introduire d'impression étrangère dans aucun lieu de notre obéissance ; somes aussi d'imprimer ou faire

imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire
lesdits Ouvrages, ni d'en faire aucun Extrait, sous
quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission
expresse & par écrit dudit Exposant ou de ceux qui
auront droit de lui, à peine de confiscation des
exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende
contre chacun des contrevenants, dont un tiers à
Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre
tiers audit Exposant, ou à celui qui aura droit de
lui, & de tous dépens, dommages & intérêts : A LA
CHARGE que ces Présentes seront enregistrées tout au
long sur le Registre de la Communauté des Imprim-
meurs & Libraires de Paris dans trois mois de la
date d'icelles ; que l'impression desdits Ouvrages sera
faite dans notre royaume & non ailleurs, en bon
papier & beaux caractères, conformément à la feuille
imprimée attachée pour modèle sous le contre-scel des
Présentes ; que l'Impétrant se conformera en tout aux
Règlements de la Librairie, & notamment à celui du
10. Avril 1725. qu'avant de les exposer en vente, les
Manuscrits qui auront servi de copie à l'impression
desdits Ouvrages seront remis, dans le même état où
l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre
très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le
Sieur De Lamoignon ; & qu'il en fera ensuite remis
deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique,
un dans celle de notre château du Louvre, un dans
celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier
de France le Sieur De Lamoignon, & un dans celle
de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux
de France, le Sieur De Machault, Commandeur de
nos ordres : le tout à peine de nullité des Présentes,
DU CONTENU desquelles vous mandons & enjoignons
de faire jouir ledit Exposant & ses ayant cause
pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur
soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que
la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au
long au commencement ou à la fin desdits Ouvrages,
soit tenue pour dûement signifiée, & qu'aux copies col-
lacionnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers

Secretaires foi soit ajoutée comme à l'original. C O M M A N D O N S au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis , de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & nécessaires , sans demander autre permission , & nonobstant clameur de Haro , Chartre Normande , & Lettres à ce contraires. C A R tel est notre plaisir. D O N N É à Versailles , le vingt-septieme jour du mois d'Octobre , l'an de grace mil sept cent cinquante-cinq , & de notre regne le quarante-unieme.

PAR LE ROI EN SON CONSEIL ,

LE B E G U E .

Registré ensemble la présente Cession sur le Registre treize de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris , N^o. 595. F^o. 464. & 465. conformément aux anciens Réglements confirmés par celui du 28. Février 1723. A Paris, le 30. Octobre 1755.

DIDOT , Syndic.

Je cede à M. JEAN-MARIE BRUYSET le Privilege pour l'édition de mes Ouvrages. Fait à Berlin , ce douzieme Août. 1755.

MAUPERTUIS.

Registré la présente Cession sur le Registre treize de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris , fol. 465. conformément aux Réglements , & notamment à l'Arrêt du Conseil du 10. Juillet 1745. A Paris, le 30. Octobre 1755.

DIDOT , Syndic.

A LYON,

De l'Imprimerie de Louis Buisson.

1756.

543836



